

## اثر افزودن چای سبز و روغن ماهی به جیره جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال علیه نیوکاسل

شقايق زارعزاده<sup>۱</sup>، محمد رostaiي علیمهر<sup>۲</sup>، علیرضا علیزاده<sup>۳</sup> و محسن محمدی قیصر<sup>۱</sup>

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۲- استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

۳- استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

(تاریخ دریافت: ۹۱/۹/۱۸ - تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۲۲)

### چکیده

به منظور بررسی اثر چای سبز و روغن ماهی بر عملکرد و عیار پادتن علیه بیماری نیوکاسل، ۴۰۵ قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از آزمون فاکتوریل  $3 \times 3$  مورد بررسی قرار گرفتند. جوجه‌ها به ۹ گروه و هر گروه به ۳ دسته ۱۵ قطعه‌ای تقسیم شدند. جوجه‌ها با ۹ جیره حاوی مقادیر صفر ( $T_0$ )،  $0.75$  ( $T_{0.75}$ ) یا  $1/5$  ( $T_{1.5}$ ) درصد پودر خشک چای سبز و مقادیر صفر ( $F_0$ )،  $0.75$  ( $F_{0.75}$ ) یا  $1/5$  ( $F_{1.5}$ ) درصد روغن ماهی تغذیه شدند. واکسن نیوکاسل در روز ۸ و ۱۷ استفاده شد. جهت تعیین عیار پادتن علیه ویروس نیوکاسل به وسیله آزمایش ممانعت از هموآگلوتیناسیون (HI) در روزهای ۲۵، ۳۲ و ۳۹، از ورید بال ۵ جوجه در هر تکرار نمونه خون گرفته شد. نتایج نشان داد که در کل دوره ضریب تبدیل خوارک بین تیمارها تفاوتی نداشت ( $P > 0.05$ ) و کمترین افزایش وزن روزانه ( $0.43 \pm 0.04$ ) و بیشترین مصرف خوارک ( $73/25$ ) در مقدار  $1/5$  درصد روغن ماهی و  $1/5$  درصد چای سبز مشاهد شد ( $P < 0.05$ ). در روز ۳۹، بیشترین عیار پادتن ( $3\%$ ) در سطح  $1/5$  درصد روغن ماهی مشاهده شد ( $P < 0.05$ ). در روزهای ۳۲ و ۳۹ عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل در سطح  $1/5$  درصد پودر خشک چای سبز (به ترتیب  $2/18$  و  $2/0.9$ ) کمتر از صفر درصد پودر خشک چای سبز (به ترتیب  $2/84$  و  $2/64$ ) بود ( $P < 0.05$ ). در نتیجه افزودن  $1/5$  درصد روغن ماهی و  $1/5$  درصد چای سبز به جیره جوجه‌های گوشتی به ترتیب سبب تحریک و تضعیف پاسخ‌های ایمنی هومورال علیه بیماری نیوکاسل می‌شود ( $P < 0.05$ ).

واژه‌های کلیدی: ایمنی، جوجه گوشتی، چای سبز، روغن ماهی، عملکرد، نیوکاسل

## مقدمه

میانگین وزنی  $5 \pm 40$  گرم انجام شد. چوچه‌ها در روز اول به طور تصادفی به ۹ گروه (تیمارها) و هر گروه به ۳ دسته (تکرارها) ۱۵ قطعه‌ای تقسیم شدند. هر گروه از چوچه‌ها در مرحله آغازین، رشد و پایانی با ۹ جیره ایزوواترژیک و یکسان از نظر پروتئین خام که حاوی مقادیر صفر، ۰/۷۵ یا ۱/۵ درصد پودر خشک چای سبز (شرکت رفاه، لاهیجان) و مقادیر صفر، ۰/۷۵ یا ۱/۵ درصد روغن ماهی (آرد ماهی خزر، بندرانزلی) تغذیه شدند. تیمارها شامل چیره‌های حاوی: صفر درصد روغن ماهی + صفر درصد پودر خشک چای سبز ( $F_0T_0$ ، صفر درصد روغن ماهی + ۰/۷۵ درصد پودر خشک چای سبز ( $F_0T_{0.75}$ )، صفر درصد روغن ماهی + ۱/۵ درصد پودر خشک چای سبز ( $F_0T_{1.5}$ )، ۱/۵ درصد روغن ماهی + صفر درصد روغن ماهی + ۰/۷۵ درصد پودر خشک چای سبز ( $F_{0.75}T_0$ ، ۰/۷۵ درصد روغن ماهی + ۰/۷۵ درصد روغن ماهی + ۱/۵ درصد پودر خشک چای سبز ( $F_{0.75}T_{0.75}$ ، ۰/۷۵ درصد روغن ماهی + ۰/۷۵ درصد روغن ماهی + ۱/۵ درصد روغن ماهی + ۰/۷۵ درصد روغن ماهی + صفر درصد پودر خشک چای سبز ( $F_{1.5}T_0$ ، ۱/۵ درصد روغن ماهی + ۰/۷۵ درصد پودر خشک چای سبز ( $F_{1.5}T_{0.75}$ ) و ۱/۵ درصد روغن ماهی + ۱/۵ درصد پودر خشک چای سبز ( $F_{1.5}T_{1.5}$ ) بودند. اجزا و ترکیبات چیره‌های مورد استفاده به ترتیب در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است. در تمام مدت دوره آزمایشی، آب و خوراک به صورت آزاد در اختیار چوچه‌ها قرار گرفت. نوردهی به صورت ۲۳ ساعت روشناکی و یک ساعت خاموشی در یک دوره ۲۴ ساعته صورت گرفت. دمای سالن در روز اول دوره آزمایشی ۳۲ درجه سانتی گراد بود و به صورت هفتگی ۲ درجه از این دما کاسته شد تا در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد ثابت نگه داشته شد. در پایان هر هفته افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک اندازه‌گیری شد.

جهت انجام واکسیناسیون و ایجاد ایمنی (بر اساس دستور العمل سازمان دامپردازی منطقه) واکسن کشته دوگانه نیوکاسل و برونشیت به صورت تزریقی به همراه سویه B1 به صورت قطره چشمی در روز ۸، واکسن گامبورو به صورت آشامیدنی در روز ۱۴، واکسن نیوکاسل سویه لاسوتا به صورت قطره چشمی در روز ۱۷ مورد استفاده قرار گرفت.

جهت تعیین عیار پادتن علیه ویروس نیوکاسل در روزهای ۲۵، ۳۲ و ۳۹ از ورید بال ۵ چوچه در هر تکرار

امروزه به منظور بالا بردن عملکرد تولید در صنعت طیور و همچنین تولید گوشت عاری از مواد شیمیایی، استفاده از افزودنی‌های طبیعی مورد توجه پرورش دهندگان چوچه‌های گوشتی قرار گرفته است. گزارش شده است افزودنی‌های گیاهی حاوی مواد دارویی و آنتی اکسیدان‌ها می‌تواند سبب افزایش عملکرد تولیدی و بهبود پاسخهای ایمنی در چوچه‌های گوشتی شود (روستائی علی‌مehr و همکاران ۱۳۹۲). مشخص شده است گیاه دارویی چای سبز حاوی مقداری زیاد آنتی اکسیدان‌های مفید است (Romeo et al., 2007; Wolfram, 2009). از طرفی هنگام تهیه جیره چوچه‌های گوشتی جهت تامین انرژی مورد نیاز استفاده از چربی‌ها اجتناب ناپذیر است. گزارش شده است روغن ماهی به دلیل داشتن میزان زیاد امگا-۳ دارای آثار مطلوب بر عملکرد سیستم ایمنی طیور است (رضاییان و همکاران، ۱۳۸۷).

نیوکاسل یکی از بیماریهای ویروسی و به شدت واگیر است که همیشه به عنوان یک خطر صنعت پرداز طیور کشور را تهدید می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که بهترین راه مبارزه با این بیماری در طیور کنترل آن از طریق واکسیناسیون و ایجاد ایمنی مناسب است. کاربرد صحیح واکسن‌ها و استفاده از مواد محرک ایمنی جهت بهبود پاسخهای سیستم ایمنی به منظور بالا بردن میزان حفاظت ایجاد شده، ضمانت بیشتری را برای موفقیت در تولید فراهم می‌کند. در نتیجه افزودن مواد محرک رشد و تقویت‌کننده سیستم ایمنی راهکار مناسبی به نظر می‌رسد. از طرفی پرورش دهندگان چوچه‌های گوشتی ملزم به تولید گوشت عاری از هرگونه مواد خطرناک برای سلامتی انسان هستند. بنابراین استفاده از مواد افزودنی طبیعی و مفید به چیره چوچه‌های گوشتی از اهمیت خاصی برخوردار است. تاکنون اثر چای سبز بر پاسخهای ایمنی چوچه‌های گوشتی بررسی نشده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی اثر چای سبز، روغن ماهی و اثر متقابل آنها بر عملکرد و پاسخهای هومورال علیه بیماری نیوکاسل است.

## مواد و روش‌ها

این آزمایش به مدت ۴۲ روز در آبان ماه سال ۱۳۹۰ در شرکت مرغ گوشتی راه درخشنan (همدان، ایران) با استفاده از ۴۰۵ قطعه چوچه یکروزه گوشتی سویه تجاری کاب با











مقایسه با روغن‌های گیاهی سبب افزایش مصرف خوراک در جوجه‌های گوشتی می‌شود (López-Ferrer *et al.*, 1999). مصرف اسیدهای چرب غیراشباع سبب افزایش مصرف خوراک در جوجه‌های گوشتی شده است (Zollitsch, 1998). تنظیم مصرف خوراک توسط روغن ماهی بستگی به میزان اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع موجود در آن دارد (Alizadeh *et al.*, 2012). به نظر می‌رسد میزان اسیدهای چرب روغن ماهی در سطحهای این آزمایش نه تنها به حدی نرسیده که اثرات منفی روی خوراک مصرفی داشته باشد، بلکه باعث بهبود معنی‌دار آن هم شده است.

در مورد اثرات چای سبز بر مصرف خوراک نتایج ضد و نقیضی وجود دارد. در حالیکه افزودن پودر خشک چای سبز Wolfram, ۲۷۹ میلی‌گرم اپی‌گالولوکاتچین ۳ گالات (Sarker *et al.*, 2007) و ۰/۵ تا ۱ درصد چای سبز (Kaneko *et al.*, 2001) به جیره افزودن چای سبز تا ۲ درصد در جیره جوجه‌های گوشتی اثری بر مصرف خوراک نداشت (Yang *et al.*, 2003). حتی نشان داده شد که افزودن ۴۰۰ میلی‌گرم اپی‌گالولوکاتچین ۳ گالات به جیره بدلرچین ژاپنی سبب افزایش مصرف خوراک شده است (Sahin *et al.*, 2010). به نظر می‌رسد استفاده از قسمت‌های مختلف گیاه، موقعیت جغرافیایی محل رویش گیاه، مرحله تکامل گیاه، شرایط رشد و زمان برداشت نیز می‌تواند موجب تغییر در مواد موثره ترکیب شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی عوامل گیاهی شود (Burger *et al.*, 1997).

نتایج نشان داد افزودن همزمان پودر خشک چای سبز و روغن ماهی تا ۰/۷۵ درصد به جیره جوجه‌های گوشتی اثری بر افزایش وزن روزانه ندارد، ولی مصرف همزمان آنها تا سطح ۱/۵ درصد سبب کاهش افزایش وزن می‌شود. گزارش شده است که مصرف ۱ (Sarker *et al.*, 2010)، ۰/۵ درصد (Uuganbayar *et al.*, 2001) و ۱/۵ درصد (Kaneko *et al.*, 2001) چای سبز و همچنین اپی‌گالولوکاتچین ۳ گالات به میزان ۲۷۹ میلی‌گرم در ۳۷۵ میلی‌گرم از کل کاتچین (Wolfram, 2007) سبب کاهش میزان افزایش وزن روزانه جوجه‌های گوشتی می‌شود. مشخص شده است که مصرف ۲ درصد (Korver and Klasing, 1997) و ۶ درصد (Al-Khalifa *et al.*, 2012) روغن ماهی و همچنین ۰/۵ درصد

اثر متقابل روغن ماهی و پودر چای سبز بر ضریب تبدیل خوراک در تمام هفته‌های پرورش به جز هفتنهای ۶، ۴ و کل دوره پرورش معنی‌دار بود ( $P<0/05$ ). در هفته اول بجز  $F_{0.75}T_{1.5}$  و  $F_{1.5}T_0$  اختلاف معنی‌داری بین تمام تیمارها وجود نداشت، در حالیکه در هفتنهای بعد تفاوت بین تیمارها کاسته شد و در هفته سوم فقط ضریب تبدیل خوراک تیمار  $F_{1.5}T_0$  با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری را نشان داده است (جدول ۶). در هفته پنجم، ضریب تبدیل خوراک تیمار  $F_0T_0$  بیشتر از تیمارهای  $F_{0.75}T_{0.75}$ ،  $F_{1.5}T_{0.75}$  و  $F_{0.75}T_0$  بود ( $P<0/05$ ). ضریب تبدیل خوراک در هفته ۶، ۴ و کل دوره پرورش تحت تاثیر روغن ماهی و چای سبز قرار نگرفت ( $P>0/05$ ).

نتایج نشان داد اثر متقابل پودر خشک چای سبز و روغن ماهی بر پاسخهای ایمنی هومورال معنی‌دار نبود ( $P>0/05$ ). در روزهای ۲۵ و ۳۲، مقادیر مختلف روغن ماهی اثری بر عیار آنتی‌بادی علیه ویروس نیوکاسل نداشت ( $P>0/05$ ). در روز ۳۹، بیشترین عیار پادتن در سطح ۱/۵ درصد روغن ماهی مشاهده شد (جدول ۷). در روزهای ۳۲ و ۳۹ روزگی عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل در سطح ۱/۵ درصد پودر خشک چای سبز کمتر از صفر درصد پودر خشک چای سبز بود ( $P<0/05$ ).

## بحث

نتایج نشان داد افزودن پودر خشک چای سبز به‌تهابی تا ۱/۵ درصد و مصرف همزمان ۰/۷۵ درصد روغن ماهی و ۰/۷۵ درصد پودر خشک چای سبز به جیره جوجه‌های گوشتی اثری بر مصرف خوراک نگذاشت، ولی افزودن ۱/۵ درصد روغن ماهی به‌تهابی سبب افزایش مصرف خوراک شد. همچنین مصرف ۱/۵ درصد پودر خشک چای سبز و ۱/۵ درصد روغن ماهی سبب کاهش مصرف خوراک شد. مشخص شده که مصرف  $0/05$  و  $0/08$  درصد روغن ماهی (Koreleski and Swiatkiewicz, 2006) در روغن ماهی قرمز تا ۴/۲ درصد (Hulan *et al.*, 1988) در جوجه‌های گوشتی سبب افزایش مصرف خوراک می‌شود. گزارش شده است که مصرف  $8/2$  درصد روغن ماهی در

جیره جوجه‌های گوشته اثر منفی روی ضریب تبدیل خوراک ندارد.

نتایج نشان داد که افزودن ۱/۵ درصد روغن ماهی به جیره جوجه‌های گوشته سبب بهبود پاسخ‌های اینمنی هومورآل بر علیه ویروس نیوکاسل می‌شود. مشخص شده است که روغن ماهی به‌واسطه داشتن ۲۰ تا ۴۰ درصد چربی امگا ۳ سبب تنظیم عملکرد سیستم اینمنی طیور می‌شود (Maroufyan *et al.*, 2012b). در شرایط آزمایشگاهی روغن ماهی سبب افزایش تولید اینترفرون گاما (Rezaee *et al.*, 2012) از سلول‌های تک هسته‌ای می‌شود. (Khatibjoo *et al.*, 2011) مصرف ۳/۵ درصد روغن ماهی در جیره جوجه‌های گوشته اگرچه در شرایط آزمایشگاهی تأثیری بر تکثیر لمفوسیت‌ها نداشته است ولی باعث افزایش پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند شده است (Ramon *et al.*, 2012). درصد روغن ماهی به جیره ججه‌های گوشته سبب افزایش بیان mRNA مرتبط با iNos<sup>1</sup> در ماکروفازهای (Selvaraj and Klasing, 2006). جوجه گوشته می‌شود (Babayemi *et al.*, 2006) هیدروکسی دوزاهگرانوئیک<sup>2</sup> موجود در روغن ماهی سبب افزایش فعالیت سلول‌های B و تولید IgM و IgG می‌شود (Maroufyan *et al.*, 2012a). گزارش شده است مصرف روغن ماهی در جوجه‌های گوشته سبب افزایش میزان اینترلوقین خون، افزایش اینترفرون گاما خون، افزایش عیار پادتن علیه ویروس نیوکاسل و افزایش عیار پادتن علیه (Ramon *et al.*, 2012) ویروس گامبورو خواهد شد (Pae *et al.*, 2012) مصرف روغن ماهی در جیره ججه‌های گوشته سبب کاهش مرگ و میر شده است (Pike, 1999). از طرفی روغن ماهی به‌دلیل آثار مهاری بر سلول‌های T به‌عنوان ماده سرکوب کننده اینمنی در درمان بیماری‌های خود اینمن (Han *et al.*, 2012) و تورم پوستی آتیپیک که یک نوع التهاب آرژی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد (Yang *et al.*, 2010) امگا ۳ موجود در روغن ماهی از طریق افزایش توسط سلول‌های T تنظیم کننده سبب کنترل فعالیت سلول‌های T کمک کننده می‌شوند (Swiatkiewicz, 2006) همچنین گزارش شده است افزودن ۵ درصد روغن ماهی به جیره مرغان مادر گوشته هفت‌های سبب کاهش پاسخ اینمنی سلولی به تزریق آلبومین سرم گاوی شده است

روغن ماهی آزاد (Rymer *et al.*, 2009) اثری بر افزایش وزن روزانه جوجه‌های گوشته ندارد. از طرفی گزارش شده است که در جوجه‌های گوشته مصرف توام پودر ماهی قرمز و روغن ماهی به میزان ۴/۲ درصد (Hulan *et al.*, 1988) و ۸/۲ درصد روغن ماهی (López-Ferrer *et al.*, 1999) و ۵ درصد روغن ماهی (Balevi and Coskon, 2000) سبب کاهش میزان افزایش وزن روزانه شد ولی مصرف همزمان روغن ماهی و محلول محصولات فرعی حاصل از تقطیر ذرت (Bharathan *et al.*, 2008) و مصرف ۳ درصد روغن ماهی (صفامهر و همکاران، ۱۳۸۹) سبب افزایش وزن روزانه شد. با توجه به نتایج متناقض گزارش شده به نظر می‌رسد اثر افزودن روغن ماهی بر افزایش وزن روزانه جوجه‌های گوشته متأثر از ترکیب جیره و اقلام مورد استفاده در جیره باشد.

نتایج نشان داد که اگرچه افزودن روغن ماهی و پودر خشک چای سبز به جیره جوجه‌های گوشته در هفته اول باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک نداشته است، ولی در کل اثری بر ضریب تبدیل خوراک نداشته است. پودر خشک Babayemi *et al.*, (2006) مشخص شده است افزودن فیبر است (Jimenez-Moreno *et al.*, 2009; Gonzalez- Jimenez Moreno *et al.*, 2009) خواهد شد (Alvarado *et al.*, 2006) جیره ججه‌های گوشته در زمان تأمین انرژی از چربیها سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک در سه هفته اول پرورش فیبر در دستگاه گوارش طیور تحت تأثیر نوع و منشا آن قرار دارد (Mc Nab, 1976). گزارش شده است افزودن ۱ درصد (Sarker *et al.*, 2010) و ۲ درصد (Yang *et al.*, 2003) پودر خشک چای سبز به جیره جوجه‌های گوشته اثری بر ضریب تبدیل خوراک ندارد. همچنین مشخص شده است افزودن روغن ماهی تا ۰/۸ درصد (Koreleski and Swiatkiewicz, 2006) و ۰/۵ درصد روغن ماهی آزاد (Rymer *et al.*, 2009) به جیره ججه‌های گوشته اثری بر ضریب تبدیل خوراک نگذشت. بنابراین احتمالاً افزودن همزمان پودر خشک چای سبز و روغن ماهی در

1. Inducible nitric oxide synthases

2. Hydroxyl dosahexaenoic

**نتیجه‌گیری کلی**

افزودن ۱/۵ درصد روغن ماهی و ۱/۵ درصد چای سبز به جیره جوجه‌های گوشتی به ترتیب سبب تحریک و تضعیف پاسخ‌های ایمنی هومورال بر علیه بیماری نیوکاسل شد. افزودن روغن ماهی و پودر چای سبز به جیره جوجه‌های گوشتی اثری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت.

(Wang *et al.*, 2002). مشخص شده است که روغن ماهی اثری بر تولید پادتن وابسته به سلول‌های سیتوتوكسیک در لوکوسیت‌های خون ندارد، ولی سبب کاهش تولید پادتن وابسته به سلول‌های سیتوتوكسیک در سلول‌های طحال می‌شود (Fritsche and Cassity, 1992). بنابراین به نظر می‌رسد اثر روغن ماهی بر سیستم ایمنی هومورال به صورت Maroufyan *et al.*, (2012a) و تا ۱/۵ درصد در جیره جوجه‌های گوشتی اثر تحریکی بر سیستم ایمنی دارد و عیار پادتن علیه ویروس نیوکاسل را افزایش می‌دهد.

نتایج نشان داد که افزودن ۱/۵ درصد پودر چای سبز به جیره جوجه‌های گوشتی سبب کاهش پاسخ‌های ایمنی هومورال بر علیه ویروس نیوکاسل می‌شود. مشخص شده است ۴۳ درصد از کل پلی‌فنل‌های چای سبز را Romeo *et al.*, (2009). اپی‌گالوکاتچین ۳ گالات تشکیل می‌دهد (Sakagami *et al.*, 1995). از طرفی مشخص شده است که کاتچین اثر مهاری بر واکنش‌های آلرژی دارد (Nihikawa *et al.*, 2007) و آنتی‌اکسیدان‌های موجود در چای سبز سبب کاهش آسیب‌های التهابی در روده می‌شود (Sharangi, 2009). اپی‌گالوکاتچین ۳ گالات از طریق کاهش بیان Nos-2<sup>۳</sup> سبب مهار پاسخ‌های ماکروفازها به LPS<sup>۴</sup> می‌شود (Olmos *et al.*, 2008) و همچنین از طریق کاهش بیان گیرنده‌های اینترلوکین ۲ سبب ممانعت از تکثیر سلول‌های CD4<sup>۵</sup> می‌شود (Pae *et al.*, 2010). مشخص شده است که اپی‌گالوکاتچین ۳ گالات یک عامل تنظیم کننده پاسخ سلول‌های T کمکی است و از طریق کاهش تولید اینترلوکین ۶ و فاکتور نکروز تومور تکثیر، تمایز سلول‌های T بی‌تجربه<sup>۶</sup> را کاهش می‌دهند (Wu *et al.*, 2012). در نتیجه به نظر می‌رسد چای سبز احتمالاً از طریق کاهش تکثیر و تمایز سلول‌های T کمکی اثر منفی بر پاسخ‌های هومورال علیه ویروس نیوکاسل دارد.

3.Nitric oxid syntitaze-2

4. *Salmonella typhimurium* lipopolysaccharide

5. Naive

## فهرست منابع

- رضاییان م., غلامی پور س., صفری ر., پورغلام ر., سلمانی جلودار ع. ۱۳۸۷. مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا - ۳ از روغن ماهی کیلکا، مجله علمی شیلات ایران، ۱۷: ۸۹ - ۱۰۰.
- روستائی علی مهر م., قهرمانی زهرائی ب., حقیقیان رودسری م. ۱۳۹۲. اثر عصاره گیاه سرخارگل (*Echinacea purpurea*) بر عملکرد و پاسخهای ایمنی سلولی و هومووال جوجههای گوشتی، مجله دامپژوهشکی ایران، ۹: ۶۰ - ۷۰.
- صفامهر ع., آقایی ن., وچگانی آذر س. ۱۳۸۹. اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد، اجزاء لاشه و فراسنجههای کیفی گوشت در جوجههای گوشتی، مجله پژوهش‌های علوم دامی، ۴: ۱۱۹-۱۳۱.
- Abo Omar J. 2000. The effect of different levels of olive pulp on the feed intake and digestibility of broilers. Bethlehem University Journal, 19: 97-100.
- Alizadeh A. R., Alikhani M., Ghorbani G. R., Rahmani H. R., Rashidi L. and Loor J. J. 2012. Effects of feeding roasted safflower seeds (variety IL-111) and fish oil on dry matter intake, performance and milk fatty acid profiles in dairy cattle. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96: 466-473.
- Al-Khalifa H., Givens D.I., Rymer C. and Yaqoob P. 2012. Effect of n-3 fatty acids on immune function in broiler chickens. Poultry Science, 91: 74-88.
- Allan W. H. and Gough R. E. A. 1974. Standard haemagglutination inhibition test for Newcastle disease, a comparison of macro and micro methods. Veterinary Research, 95: 120-123.
- Babayemi O.J., Hamzat R.A., Bamikole M.A., Anurudu N.F. and Olomola O.O. 2006. Preliminary studies on spent tea leaf: in vitro gas production as affected by chemical composition and secondary metabolites. Pakistan Journal of Nutrition, 5: 497-500.
- Balevi T. and Coskun B. 2000. Effects of some oils used in broiler rations on performance and fatty acid compositions in abdominal fat. Revue de Médecine Vétérinaire, 151: 937-944.
- Bharathan M., Schingoethe D.J., Hippen A.R., Kalscheur K.F., Gibson M.F. and Kargest K. 2008. Conjugated linoleic acid increases in milk from cows fed condensed corn distillers soluble and fish oil. Journal of Dairy Science, 91: 2796-2807.
- Burger R., Torres A., Warren R., Caldwell V. and Hunghes B. 1997. Echinacea induced cytokine production by human macrophages. International Journal of Immunopharmacology, 19: 371-379.
- Fritsche K.L. and Cassity N.A. 1992. Dietary n-3 fatty acids reduce antibody-dependent cell cytotoxicity and altereicosanoid release by chicken immune cells. Poultry Science, 71: 1646-57.
- Gonzalez-Alvarado J.M., Jimenez-Moreno E., Lazaro R. and Mateos G.G. 2007. Effect of type of cereal, heat processing of the cereal, and inclusion of fiber in the diet on productive performance and digestive traits of broilers. Poultry Science, 86: 1705-1715.
- Han SC., Kang G.J., Ko Y.J., Kang H.K., Moon S.W., Ann Y.S. and Yoo E.S. 2012. Fermented fish oil suppresses T helper 1/2 cell response in a mouse model of atopic dermatitis via generation of CD4+CD25+Foxp3+ T cells. BMC Immunology, 13: 44.
- Hulan H.W., Ackman R.G., Ratnayake M.N. and Proudfoot, F.G. 1988. Omega-3 fatty acid levels and performance of broiler chickens fed redfish meal or redfish oil. Canadian Journal of Animal Science, 68: 533-547.
- Jimenez-Moreno E., Gonzalez-Alvarado J.M., Gonzalez-Serrano A., Lazaro R. and Mateos G.G. 2009. Effect of dietary fiber and fat on performance and digestive traits of broilers from one to twenty-one days of age. Poultry Science, 88: 2562-2574.
- Kaneko K., Yamasaki K., Tagawa Y., Tokunaga M., Tobisa M. and Furuse M. 2001. Effect of dietary Japanese green tea powder on growth, meat ingredient and lipid accumulation in broilers. Journal of Animal Science, 38: 77-85.
- Khatibjoo A., Kermanshahi H., Golian A. and Zaghari M. 2011. The effect of dietary n-6:n-3 ratio and sex on broiler breeder immunity. Poultry Science, 90: 2209-16.
- Koreleski J. and Swiatkiewicz S. 2006. The influence of dietary fish oil and vitamin E on the fatty acid profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. Journal of Animal and Feed Science, 15: 631-640.
- Korver D.R. and Klasing K.C. 1997. Dietary fish oil alters specific and inflammatory immune responses in chicks. Journal of Nutrition, 127: 2039-2046.
- López-Ferrer S., Baucells M.D., Barroeta A.C. and Grashorn M.A. 1999. n-3 enrichment of chicken meat using fish oil: alternative substitution with rapeseed and linseed oils. Poultry Science, 78: 356-365.
- Maroufyan E., Kasim A., Ebrahimi M., Loh T.C., Bejo M.H., Zerihun H., Hosseni F., Goh Y.M. and Farjam AS. 2012a. Omega-3 polyunsaturated fatty acids enrichment alters performance and immune response in infectious bursal disease challenged broilers. Lipids Health Disease, 25: 11-15.

- Maroufyani E., Kasim A., Ebrahimi M., Loh TC., Hair-Bejo M. and Soleimani A.F. 2012b. Dietary methionine and n-6/n-3 polyunsaturated fatty acid ratio reduce adverse effects of infectious bursal disease in broilers. *Poultry Science*, 91: 2173-2182.
- Mc Nab J. M. 1973. Sources of fiber are digested to different extents depending on the source of the fiber and ingredient. *Worlds Poultry Science*, 29: 251-263.
- Nishikawa H., Wakano K. and Kitani S. 2007. Inhibition of NADPH oxidase subunits translocation by tea catechin EGCG in mast cell. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 362: 504-509.
- Olmos A., Giner R.M., Recio M.C., Ríos J.L., Gil-Benso R. and Máñez S. 2008. Interaction of dicaffeoylquinic derivatives with peroxynitrite and other reactive nitrogen species. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 475: 66-71.
- Pae M., Meydani S.N. and Wu D. 2012. The role of nutrition in enhancing immunity in aging. *Aging and Disease*, 3: 91-129.
- Pae M., Ren Z., Meydani M., Shang F., Meydani S.N. and Wu D. 2010. Epigallocatechin-3-gallate directly suppresses T cell proliferation through impaired IL-2 utilization and cell cycle progression. *Journal of Nutrition*, 140: 1509-1515.
- Pike I.H. 1999. Health benefits from feeding fish oil and fish meal. International fishmeal and oil manufacturers association, Retrieved December 4, 2012. From [www.gpfeeds.co.uk/analysis/fish\\_oil.pdf](http://www.gpfeeds.co.uk/analysis/fish_oil.pdf).
- Ramon S., Gao F., Serhan C.N. and Phipps R.P. 2012. Specialized proresolving mediators enhance human B cell differentiation to antibody-secreting cells. *Journal of Immunology*, 189: 1036-42..
- Rezaee M.A., Motaharinia Y., Hosseini W., Jalili A., Rashidi A., Mosavi B., Zamini G. and Rahmani M.R. 2012. Natural oils enhance IL-10 and IFN- $\gamma$  production by human PBMCs cultured with Malassezia furfur, *Iranian Journal of Immunology*, 9: 109-118.
- Romeo L., Intrieri M., D'Agata V., Mangano N.G., Oriani G., OntarioM.L. and Scapagnini G. 2009. The Major green tea polyphenol,(-)-epigallocatechin-3-gallate, induces heme oxygenase in rat neurons and acts as an effective neuroprotective agent against oxidative stress. *Journal of the American College of Nutrition*, 28: 492-499.
- Rymer C., Gibbs R.A. and Givens D.I. 2009. Comparison of algal and fish sources on the oxidative stability of poultry meat and its enrichment with omega – 3 polyunsaturated fatty acids. *Poultry Science*, 89: 150-159.
- Sahin K., Orhan C., Tuzcu M., Ali S., Sahin N. and Hayirlis A. 2010. Epigallocatechin-3-gallate prevents lipid peroxidation and enhances antioxidant defense system via modulating hepatic nuclear transcription factors in heat- stressed quails. *Poultry Science*, 89: 2251-2258.
- Sakagami H., Takeda M., Sugaya K., Omata T., Takahashi H., Yamamura M., Hara Y. and Shimamura T. 1995. Stimulation by epigallocatechin gallate of interleukin-1 production by human peripheral blood mononuclear cells. *Anticancer Research*, 15: 971-974.
- Sarker M.S.K., Kim G.M. and Yang C.J. 2010. Effect of green tea and biotide on performance, meat quality and organ development in Ross broiler. *Journal of Egypt Poultry Science*, 130:77-88.
- Selvaraj R.K. and Klasing K.C. 2006. Lutein and eicosapentaenoic acid interact to modify iNOS mRNA levels through the PPARgamma/RXR pathway in chickens and HD11 cell lines. *Journal of Nutrition*, 136: 1610-6.
- Sharangi A.B. 2009. Medicinal and therapeutic potentialities of tea (*Camellia sinensis* L.). *Food Research International*, 42: 529–535.
- SPSS Inc. 2009. PASW Statistics for Windows, Version 18.0. Chicago: SPSS Inc.
- Uuganbayar D. 2004. A study on the utilization of green tea for laying hens and broiler chicks. A dissertation for the degree of doctor of philosophy, Sunchon National University,Suncheon, Korea.
- Wang Y.W., Ajuyah A.O., Sunwoo H.H., Cherian G. and Sim J.S. 2002. Maternal dietary N-3 fatty acids alter the spleen fatty acid composition and bovine serum albumin-induced wing web swelling in broilers. *Poultry Science*, 81: 1722-1727.
- Wolfram S. 2007. Effects of green tea and EGCG on cardiovascular and metabolic health. *Journal of American College of Nutrition*. 26: 373-388.
- Wu D., Wang J., Pae M. and Meydani S.N. 2012. Green tea EGCG, T cells, and T cell-mediated autoimmune diseases. *Molecular Aspects of Medicine*, 33: 107-18.
- Yang C.J., Yang I.Y., Oh D.H., Bae I.H. and Cho S.G. 2003. Effect of green tea by-product on performance and body composition in broiler chicks. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 16: 867-872.
- Zollitsch W., Knaus W., Aichinger F. and Lettner F. 1997. Effects of different dietary fat source on performance and carcass characteristics of broiler. *Animal Feed Science*. 66: 63-73.

## The effect of the addition of green tea and fish oil to diet of broiler on the performance and response of humoral immunity against Newcastle

S. Zare-Zade<sup>1</sup>, M. Roostaei-Ali Mehr<sup>2\*</sup>, A. R. Alizadeh<sup>3</sup>, M. Mohammadi Gheysar<sup>1</sup>

1. MSc student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2. Assistant professor in the Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
3. Assistant professor in the Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Saveh, Iran

(Received: 12-8-2012- Accepted: 3-12-2013)

### Abstract

In order to study the effect of green tea and fish oil on performance and antibody titer against Newcastle disease, 405 day-old broiler chickens were evaluated in a  $3 \times 3$  factorial experiment using completely randomized design. Chicks were divided into 9 parts and each part was split into 3 groups. Each part was fed by diet containing 0% ( $T_0$ ), 0.75% ( $T_{0.75}$ ) or 1.5% ( $T_{1.5}$ ) dry powder of green tea and 0% ( $F_0$ ), 0.75% ( $F_{0.75}$ ) or 1.5% ( $F_{1.5}$ ) fish oil. Feed intake, gain weight and feed conversion ratio were estimated weekly. The vaccine of Newcastle was inoculated at 8 and 17d. To assay the antibody of Newcastle by HI test, blood samples were collected from five chicks of each group from brachial vein at 25, 32 and 39 d. The results showed that there was no difference between treatments on the feed conversion ratio ( $P > 0.05$ ) and the lowest weight gain (30.43) and the highest feed intake (72.25) were observed by 1.5% fish oil and 1.5% green tea. At 39 d, the highest level of antibody (3) was obtained by 1.5 % fish oil ( $P < 0.05$ ). At 32 and 39d, the levels of antibody against Newcastle was lower in 1.5% green tea (2.09 and 2.18, respectively) than 0% green tea (2.64 and 2.84, respectively;  $P < 0.05$ ). Therefore, the addition of 1.5% fish oil and 1.5% green tea to diet of broiler chickens increased and decreased the humoral immunity responses against Newcastle disease, respectively.

**Keywords:** Feed conversion ratio, Fish oil, Green tea, Newcastle, Immunity

\*Corresponding author: roostaei@guilan.ac.ir