



تحقیقات تولیدات دامی

سال هفتم/شماره اول/بهار ۱۳۹۷ (۸۱-۹۲)



اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک

رامین ولی‌زاده^۱، روح‌الله کیان‌فر^{۲*} سیدعلی میرقلنچ^۲، مجید علیایی^۲

۱- دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

۲- استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

(تاریخ دریافت: ۹۶/۰۸/۰۲ - تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۰/۰۳)

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ‌های تخم‌گذار انجام شد. در این آزمایش تعداد ۲۸۸ قطعه مرغ تخم‌گذار سویه های لاین W36 در سن ۷۶ هفتگی و بعد از تولک بر اساس درصد تولید و وزن بدن انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 3×3 با چهار تکرار و هشت مرغ در هر تکرار استفاده شد. فاکتورها شامل سه سطح پودر فلفل قرمز (۰، ۱ و ۲ درصد) و سه سطح پودر زنجبیل (۰، ۱ و ۲ درصد) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که سطح ۲ درصد فلفل قرمز در مقایسه با سطح صفر درصد آن، تولید تخمرغ (۷۱/۲۳ در مقابل ۷۱/۲۳ درصد)، وزن توده تخمرغ تولیدی (۴۵/۳۹ در مقابل ۴۵/۵۳ گرم) و میزان ایمنوگلوبین کل و M را بهطور معنی‌داری افزایش داد ($P < 0.05$). همچنین سطح ۲ درصد زنجبیل به‌طور معنی‌داری در مقایسه با سطح صفر درصد آن، تولید تخمرغ (۶۸/۱۸ در مقابل ۷۵/۸۵ درصد)، وزن توده تخمرغ تولیدی (۴۳/۳۴ در مقابل ۴۹/۴۱ گرم) و میزان ایمنوگلوبین M را به‌طور معنی‌داری افزایش و ضربیت تبدیل خوارک و هزینه خوارک برای تولید کیلوگرم تخمرغ را کاهش داد ($P < 0.05$). اثر متقابل فلفل و زنجبیل بر درصد تولید توده تخمرغ و ضربیت تبدیل خوارک معنی‌دار بود ($P < 0.05$) به طوری که بهترین اثر زنجبیل بر درصد تولید در سطح یک درصد فلفل مشاهده شد و همچنین بهترین اثر فلفل قرمز در سطح ۱ درصد زنجبیل مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از ۲ درصد پودر فلفل قرمز یا زنجبیل در جیره تاثیر مثبتی بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی داشت، ولی در هنگام استفاده توأم این دو افزودنی (۲ درصد زنجبیل و یک درصد فلفل قرمز) عملکرد تولیدی بهتری مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی: ایمنی هومورال، زنجبیل، فلفل قرمز، صفات عملکردی، مرغ تخم‌گذار

مقدمه

Arkan *et al.*, 2012; Zhao *et al.*, 2011). همچنین زنجبیل باعث افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی شامل لیپاز، دی‌ساقاریداز و مالتاز می‌شود (Zhao *et al.*, 2011). نشان داده شده که زنجبیل سبب افزایش میزان لاکتوباسیل‌ها در ژئنوم طیور شده و باعث بهبود بازده غذایی می‌شود. همچنین خواص ضد باکتریایی زنجبیل بر روی باکتری‌های پاتوژن نیز به اثبات رسیده است (Koachere *et al.*, 2002).

خانواده گیاهان فلفل قرمز (*Capsicum annuum*) به طور گستردگی در رژیم غذایی و داروهای سنتی شرقی بدون اینکه هیچ‌گونه عوارض جانبی جدی داشته باشند استفاده می‌شوند. فلفل قرمز (*Capsicum annuum L.*) از خانواده Solanaceae است که در اکثر نقاط گرم‌سیری و نیمه‌گرم‌سیری جهان کشت می‌شود. در میوه آن کپساکین (Capsanthin) مسبب طعم تند کپسانتین (Capsaicin) مسبب رنگ قرمز کپسیتین، سولانین، کیپسورین، آلالکالوئیدها، فلاونوئیدها، اسیدهای چرب، روغن‌های فرار، کاروتونئید، کاروتون، قند و ویتامین‌های A, B, C و E وجود دارد. علاوه بر این، فلفل‌ها غنی از فلاونوئیدها به ویژه پلی‌فنول‌ها، کوئرستین (Quercetin) و لوتئولین هستند (Lee *et al.*, 1995). در جوجه‌های گوشتی اثر دو خوراک آزمایشی تهیه شده با ۵ و ۲۰ میلی‌گرم محصول عصاره فلفل قرمز بررسی شد. کپساکین بر ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در کل دوره معنی‌دار نبود، اما مکمل‌سازی فلفل تند میزان مرگ و میر را کاهش داد. در ادامه این بررسی ویژگی هضمی کپساکین به وسیله تحریک آنزیمهای هضمی از راه نمونه‌برداری از مواد هضمی در جوجه‌های گوشتی با جیره حاوی ۵ تا ۲۰ میلی‌گرم بررسی شد و تاثیر مثبت کپساکین بر فعالیت آنزیمهای دوازده (شامل آمیلاز لیپاز و پروتئاز) مشاهده شد (Paraksa, 2011). همچنین ترکیبات فنولی موجود در فلفل قرمز فعالیت HMG-CoA ردوکتاز را مهار می‌نمایند و در نتیجه منجر به مهار سنتز کلسترول نیز می‌شود (Lokaewmanee *et al.*, 2010).

با توجه به خواص ضد میکروبی، آنتی‌اسیدانی و سایر خواص فلفل قرمز و زنجبیل، افزودن این ترکیبات در جیره‌های بر پایه گندم ممکن است

عموماً گندم به عنوان ماده خوارکی حاوی پلی‌ساریدهای غیرنشاسته‌ای (NSP) محلول و ویسکوز بالا شناخته می‌شود (Annison and Choct, 1991). NSP‌های محلول دارای فعالیت ضدتغذیه‌ای در طیور هستند که بخشی از آن مربوط به تغییر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش است. افزایش مقدار NSP‌های محلول می‌تواند بار میکروبی را در روده کوچک افزایش دهد و این اثرات منفی NSP‌ها به وسیله Choct *et al.*, 1995 استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها تا حدی رفع می‌شود.

در سال‌های اخیر به دلیل نگرانی از پیامدهای مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در جیره حیوانات اهلی روی سلامتی انسان و حیوان، استفاده از فرآورده‌های گیاهی در جیره طیور افزایش یافته است (Cogliani *et al.*, 2011). عصاره‌های گیاهی از برگ، ریشه، غده یا میوه گیاهان دارویی و یا ادویه‌ای منشاء می‌گیرند. این مواد افزودنی در طول سال‌های اخیر به عنوان مکمل خوراک برای مقاصد مختلف در تولید طیور مورد توجه قرار گرفته‌اند (Wegener *et al.*, 1999). اثرات سودمند گیاهان دارویی در تغذیه دام ممکن است شامل تحریک اشتها و مصرف خوراک، بهبود ترشح آنزیمهای گوارشی درون‌زا، فعال‌سازی پاسخ‌های ایمنی و ضد باکتری، عمل ضد ویروس و آنتی‌اسیدان باشد (Steiner, 2010). بروز عوارض ناشی از مصرف داروها و مواد شیمیایی و افزایش دائمی هزینه‌های تولید، راهی بجز استفاده از مواد طبیعی و بی‌ضرر و افزودنی‌های جدید باقی نخواهد گذاشت. زنجبیل به عنوان یک ادویه و گیاه دارویی شناخته شده است. بیش از ۲۵۰۰ سال است که در چین از این گیاه به عنوان یک ماده طعم‌دهنده و ضدقارچ استفاده می‌شود. این گیاه ترکیبات متعددی نظیر جین جرول، جین دیول و جین جردیون دارد که فعالیت آنتی‌اسیدانی زیادی از خود نشان می‌دهند (Steiner, 2010). به نظر می‌رسد بیشتر ارزش درمانی زنجبیل به واسطه ترکیبات ادویه‌ای آن یعنی جین جرول‌ها است که طعم تند و سوزاننده آن ناشی از آن‌هاست، اگر چه هنوز مکانیسم عمل آن مشخص نیست (Herawatiand, 2011). مطالعات نشان داده است که گیاه زنجبیل با افزایش آنزیمهای گوارشی به هضم و جذب مواد

استفاده از مقدار مصرف خوراک و تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی تعیین شد. برای محاسبه هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم از خوراک (ربال) در ضریب تبدیل غذایی ضرب شد و نتیجه حاصل در تجزیه مورد استفاده قرار گرفت. وزن تخم مرغ تولیدی به صورت هفتگی اندازه گیری شد. مجموع وزن تخم مرغ تولیدی ۵۶ روز برای هر مرغ و با توجه به قیمت تمام شده تخم مرغ و قیمت فروش سود حاصل از کیلوگرم تخم مرغ و سود به ازای هر مرغ محاسبه شد. برای اندازه گیری پاسخ سیستم ایمنی هومووال از هر تکرار دو پرنده انتخاب و یک میلی لیتر محلول ۰/۵ سوسپانسیون گلوبول قرمز گوسفنندی (SRBC) به صورت عضلانی به عضله سینه مرغها در دو نوبت با فاصله یک هفته تزریق شد. دو هفته بعد با خون گیری از سیاه رگ بال تیتر آنتی بادی کل، IgG و IgM با استفاده از روش توصیف شده Lepage *et al.* (1996) ارزیابی شد. در پایان، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SAS (2009) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه تفاوت بین میانگین ها از آزمون توکی کرامر در سطح معنی داری ۵ درصد استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از افزودن پودر فلفل قرمز و زنجیبل بر عملکرد مرغ تخمگذار در جداول ۲ و ۳ ارائه شده است. تاثیر افزودن پودر فلفل قرمز و زنجیبل بر درصد تولید تخم مرغ معنی دار بود و سطح دو درصد هر دو افزودنی بهترین عملکرد را در بی داشت. به طوری که فلفل قرمز ۲/۵۵ درصد و زنجیبل ۷/۶۷ درصد تولید را بهبود بخشید. با توجه به معنی داری اثرات متقابل زنجیبل و فلفل قرمز بر درصد تولید، کمترین تولید مربوط به تیمار بدون افزودنی و بیشترین تولید را سطح ۲ درصد زنجیبل و ۱ درصد فلفل به خود اختصاص دادند ($P<0.05$). بیشترین تاثیر افزودن زنجیبل در سطح یک درصد فلفل و کمترین اثر در سطح دو درصد فلفل مشاهده شد ($8/53$ درصد افزایش تولید در مقابل $6/23$ درصد). این اثر در مورد فلفل نیز مشاهده شد. به طوری که بهترین تاثیر فلفل در سطح یک درصد زنجیبل و کمترین تاثیر در سطح دو درصد زنجیبل مشاهده شد ($3/59$ درصد

اثرات منفی NSP ها را از راه کاهش فعالیت میکروبی و افزایش آنزیم های دستگاه گوارش تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ریشه زنجیبل و پودر فلفل قرمز بر صفات عملکردی و ایمنی هومووال در مرغ های تخم گذار بود.

مواد و روش ها

برای انجام این آزمایش از ۲۸۸ قطعه مرغ نژاد لگهورن سویه های لاین W36 در سن ۷۶ هفتگی بعد از دوره تولک بر اساس درصد تولید و وزن بدن (با وزن متوسط 1500 ± 50 گرم) انتخاب و به صورت آزمایش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و ۸ مرغ در هر تکرار انجام شد. فاکتورها عبارت بودند از ۳ سطح پودر فلفل قرمز (۰، ۱ و ۲ درصد) و ۳ سطح زنجیبل (۰، ۱ و ۲ درصد). قفس ها با ابعاد $30 \times 30 \times 46$ سانتیمتر به صورت سه طبقه و سیستم کالیفرنیایی بودند، ولی برای انجام آزمایش فقط از طبقه دوم استفاده شد. در هر قفس دسترسی کافی و اختصاصی به داخوری ناودانی و آبخوری پستانکی بود. قبل از شروع آزمایش، وزن بدن و تولید تخم مرغ ۱۰۰۰ مرغ تخمگذار طی دو هفته رکوردبدراری شد و از بین آنها ۲۸۸ مرغ تخمگذار انتخاب شد. مرغ های انتخاب شده بر اساس وزن (1300 ± 50 گرم) و تولید مشابه (70 ± 3) بین واحد های آزمایشی تقسیم شدند. هفت روز جهت سازگاری پرنده با شرایط جدید آزمایشی در نظر گرفته شد. طول دوره این آزمایش ۵۶ روز بود. یک جیره پایه بر پایه گندم و طبق توصیه کاتالوگ برورشی سویه های لاین تنظیم شد (جدول ۱). سپس فلفل قرمز و زنجیبل جایگزین سبوس جیره شد. جیره ها به صورت روزانه و به مقدار ۱۱۰ گرم برای هر پرنده در اختیار آنها قرار گرفت. دفعات خوراک دهی روزانه در دو نوبت صبح و عصر انجام شد. وزن و تولید تخم مرغ اولیه پرنده ها در ابتدای دوره ثبت شد. نیم ساعت قبل از مصرف خوراک صبح، پس مانده خوراک روز قبل جمع آوری و توزین شد، سپس خوراک جدید در اختیار پرنده ها قرار گرفت. خوراک مصرفی و مقدار تولید به صورت هفتگی و بر اساس روز مرغ، محاسبه شد. با استفاده از درصد تولید و وزن تخم مرغ ها، وزن توده تخم مرغ تولیدی محاسبه شد. همچنین با

جدول ۱- اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی
Table 1. Feed ingredients and composition of experimental diet

Feed ingredients	Control diet
Wheat grain	69.20
Soybean meal	14.61
Wheat bran	4
Soy oil	1.26
Dicalcium phosphate	1.1
Oyster shells	8.88
Common salt	0.15
Sodium bicarbonate	0.1
DL-Methionine	0.2
L-Lysine-HCL	0.11
Vitamin premix	0.25
Mineral premix	0.25
Chemical composition	
ME (kcal/kg)	2700
Crude protein (%)	16
Calcium (%)	4
Available phosphorus (%)	0.38
Methionine (%)	0.45
Methionine+cysteine (%)	0.72
Lysine (%)	0.79
Threonine (%)	0.58
Tryptophan (%)	0.22
Dietary anion cation balance (meq/kg)	204

¹ Supplied vitamins per kilogram of diet: mg: A, 10000 IU, D3 2500 IU, E 10 IU, B1 2.2 mg, B2 4 mg, B3 8mg, B6 2 mg, B9 0.56 mg, B12, 0.015 mg, Cholin 200mg.

² Supplied minerals per kilogram of diet: Mn, 80 mg, Fe 50 mg, Zn 60 mg, Cu 12 mg, Sodium Selenite 0.3 mg.

³ Dietary electrolyte balance

استفاده از سطح ۳۵/۲۶ میلی‌گرم پودر فلفل قرمز در کیلوگرم جیره تاثیر معنی‌داری بر درصد تولید تخم ندارد (Gonzalez *et al.*, 1999). علاوه بر این نشان داده شد که استفاده از پودر فلفل قرمز در سطح ۴۰ گرم در کیلوگرم جیره مرغ تخم‌گذار هیچ تاثیری بر درصد تولید تخم مرغ ندارد (Bolu *et al.*, 2014). همین طور استفاده از سطح ۰/۵ درصد فلفل قرمز در جیره مرغ تخم‌گذار در مقایسه با گروه شاهد هیچ تفاوت معنی‌داری بر درصد تولید تخم مرغ در پی نداشت (Lokaewmanee *et al.*, 2010). علت احتمالی تناقض بین نتایج این آزمایش با نتایج دیگر محققان می‌تواند به دلیل نوع جیره مورد استفاده باشد زیرا مرغ‌های تخم‌گذار معمولاً جیره‌های بر پایه ذرت را به خوبی هضم می‌کنند ولی جیره‌های بر پایه گندم را به دلیل وجود NSP‌های محلول ویسکوز نمی‌توانند به خوبی هضم کنند و انتقال مواد هضم

افزایش تولید در مقابل ۱/۵۴%). با توجه به نتایج بدست آمده چنین استنباط می‌شود که افزودن فلفل و زنجبيل در سطح دو درصد به جیره نه تنها سبب بهبود درصد تولید نشد بلکه نسبت به زمانی که سطح یک درصد فلفل و سطح دو درصد زنجبيل بکار رفته بود، درصد تولید کاهش یافت. مشابه با نتایج بدست آمده در این آزمایش، در تحقیقی نشان داده شد که استفاده از پودر ریشه زنجبيل تا سطح ۰/۷۵ درصد جیره به مدت ۸ هفته، سبب افزایش درصد تولید شد (Akbarian *et al.*, 2011). همچنین بهبود درصد تولید در مرغ‌های تخم‌گذار با استفاده از مخلوط پودر زنجبيل (۰/۵٪) و سیر (۰/۱٪) در جیره نشان داده شده است (Ademola *et al.*, 2012)، ولی در گزارش دیگری استفاده از پودر زنجبيل تا سطح ۲ درصد جیره هیچ تاثیری بر درصد تولید تخم مرغ نشان نداد (Zhao *et al.*, 2011). گزارش شده است که

درصد فلفل توانست تولید توده‌ای تخممرغ را ۲/۱۴ گرم بهبود بخشد. زنجبیل نیز به صورت معنی‌داری ($P<0.05$) سبب بهبود توده تخممرغ تولیدی شد به طوری که سطح ۲ درصد زنجبیل، ۶/۰۷ گرم تولید توده‌ای تخممرغ را افزایش داد. اثرات متقابل زنجبیل و فلفل قرمز بر تولید توده‌ای تخممرغ معنی‌دار بود ($P<0.05$) و بیشترین درصد تولید در سطح ۲ درصد زنجبیل بدون توجه به درصد فلفل مشاهده شد، ولی تاثیر زنجبیل در سطح صفر فلفل بیشترین و در سطح ۲ درصد فلفل کمترین بود (۷/۳۹ در مقابل ۴/۶۷ گرم). در مورد اثر فلفل در مقابل سطوح زنجبیل چنین روندی مشاهده نشد و بهترین تاثیر فلفل در سطح ۱ درصد زنجبیل و کمترین تاثیر آن در سطح ۲ درصد زنجبیل مشاهده شد (۴ در مقابل ۰/۱۶ گرم). گزارش Zhao et al. (2011) حاکی از آن است که استفاده از پودر زنجبیل باعث افزایش توده تخممرغ تولیدی می‌شود و بهترین نتیجه زمانی بدست آمد که از آن به میزان ۱ درصد جیره استفاده شد. بر خلاف نتیجه بدست آمده در این آزمایش، گزارش شده که استفاده از پودر فلفل قرمز تا سطح ۰/۵ درصد جیره هیچ تاثیر معنی‌داری بر توده تخممرغ تولیدی ندارد (Lokaewmanee et al., 2010). شاخص توده تخممرغ معیار مناسب‌تری نسبت به درصد و وزن تولید برای ارزیابی عملکرد تولید است و تلفیقی از هر دو عامل است. بهبود توده تخممرغ تولیدی نشان‌دهنده بهبود عملکرد تولیدی مرغ‌ها است. بهبود توده تخممرغ تولیدی می‌تواند به دلیل

نشده به انتهای دستگاه گوارش سبب رشد میکرووارگانیسم‌ها می‌شود. ممکن است اثر ضد میکروبی فلفل قرمز و زنجبیل و اثرات تحریک‌کنندگی ترشح شیرابه‌های هضمی این دو ادویه سبب حل مشکل پلی‌ساقاریدهای غیر نشاسته شده باشد زیرا نشان داده شده که زنجبیل سبب افزایش میزان لاکتوباسیل‌ها در ژئنوم طیور و بهبود بازده غذایی می‌شود. همچنین خواص ضدباکتریایی زنجبیل روی باکتری‌های پاتوژن نیز به اثبات رسیده است (Koachere et al., 2002). علاوه بر این گزارش شده گیاه زنجبیل با افزایش آنزیمهای گوارشی به هضم و جذب مواد غذایی کمک می‌نماید (Arkan et al., 2012). همچنین در مورد فلفل نیز گزارشات مشابهی وجود دارد که بررسی ویژگی هضمی کپسایسین به وسیله تحریک آنزیمهای هضمی از راه نمونه‌برداری از مواد هضمی در جوجه‌های گوشتی با جیره حاوی ۵ تا ۲۰ میلی-گرم بررسی شد و تاثیر مثبت کپسایسین بر فعالیت آنزیمهای دوازده (شامل آمیلاز لیپاز و پروتئاز) مشاهده شده است (Paraksa, 2011).

وزن تخم مرغ تحت تاثیر فلفل قرمز، زنجبیل و اثرات متقابل آنها قرار نگرفت. نتیجه بدست آمده مطابق با نتایج محققان دیگر (Zhao et al., 2011; Akbarian et al., 2011) بود که گزارش کردند با سطوح مختلف زنجبیل وزن تخممرغ تغییر نمی‌کند.

توده تخممرغ تولیدی به صورت معنی‌داری ($P<0.05$) تحت تاثیر فلفل قرمز قرار گرفت ولی بین سطوح ۱ و ۲ درصد فلفل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. به طور کلی سطح ۲

جدول ۲- اثرات سطوح پودر فلفل قرمز و زنجبیل در جیره پس از تولک مرغان تخم‌گذار بر عملکرد تولیدی

Table 2. Effects of different levels of red pepper and ginger root powders in post-molting diet of laying hens on production performance

Ginger or red pepper (%)	Egg production	Egg weight (g)	Egg mass (g)	Feed intake (g)
0 % RPP ¹	71.23 ^c	63.72	45.39 ^b	102.9
1 % RPP	72.45 ^b	64.61	46.81 ^{ab}	103.57
2 % RPP	73.78 ^a	64.42	47.53 ^a	103.96
SEM	0.33	0.37	0.54	0.67
P value	0.001	0.06	0.03	ns
0 % GRP ²	68.18 ^c	63.56	43.34 ^c	103.8 ^{ab}
1 % GRP	73.43 ^b	63.99	46.99 ^b	104.33 ^a
2 % GRP	75.85 ^a	65.14	49.41 ^a	102.3 ^b
SEM	0.33	0.37	0.54	0.64
P value	<0.01	0.59	<0.01	<0.01

Means within same column with different letters differ significantly ($P<0.05$). ns: non-significant.

1. Red pepper powder 2. Ginger root powder

آزمایش، گزارش شده که استفاده از پودر زنجبیل تا سطح ۰/۷۵ درصد جیره مرغ تخم‌گذار، هیچ تاثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی نداشت (Arkan *et al.*, 2012). بر خلاف نتیجه بدست آمده در این آزمایش، در گزارشی نشان داده شد که استفاده از پودر زنجبیل تا سطح ۲ درصد جیره، در مرغ تخم‌گذار هیچ تاثیر معنی‌داری بر میزان خوراک مصرفی نداشت (Zhao *et al.*, 2011). همچنین در تحقیقی گزارش شد که استفاده از مخلوط پودر سیر و پودر زنجبیل در جیره مرغ تخم‌گذار، تاثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی در سطح پایین نداشت ولی در سطوح بالاتر (۲ درصد) روند افزایش خوراک مصرفی به صورت معنی‌دار بود (Ademola *et al.*, 2012). مشابه با نتیجه بدست آمده در این آزمایش، گزارش شد که استفاده از پودر فلفل قرمز به مقدار ۴ درصد جیره مرغ تخم‌گذار، تاثیر معنی‌داری بر مقدار خوراک مصرفی نداشت (Bolu *et al.*, 2014). همچنین گزارش شده که استفاده از فلفل قرمز تا سطح ۹/۶ قسمت در میلیون جیره مرغ تخم‌گذار در ۳۰ هفتگی، هیچ تاثیر معنی‌داری بر خوراک مصرفی نداشت (Lee *et al.*, 1995). علت عدم کاهش مصرف خوراک در اثر استفاده از فلفل و زنجبیل را می‌توان به حس چشایی ضعیف در مرغ نسبت داد.

با توجه به جداول ۴ و ۵ مشاهده می‌شود که ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر زنجبیل قرار گرفت و لی تاثیر فلفل قرمز بر آن معنی‌دار نبود. با افزایش سطوح زنجبیل در جیره

جذب بیشتر مواد مغذی باشد به طوری که Lokaewmanee *et al.* (2010) گزارش کردند که افزایش ارتفاع، سطح ویلی-ها و هیپرتروفی بافتی ویلی‌ها و سلول‌های اپیتلیال در جیره حاوی فلفل قرمز نشان می‌دهد که پس از تغذیه فلفل قرمز، عملکرد جذب روده افزایش می‌یابد. همچنین نشان داده شده است که کپسایسین سبب افزایش فعالیت گلوكز ۶-فسفات دهیدروژناز و لیپوپروتئین لیپاز چربی شده که باعث افزایش مصرف انرژی و مواد مغذی به وسیله سلول‌ها می‌شود (Horowitz *et al.*, 1992). مشابه با نتیجه بدست آمده در این آزمایش، گزارش شده که استفاده از ۱ درصد زنجبیل در جیره مرغ تخم‌گذار باعث بهبود درصد تولید و وزن توده-ای تخممرغ شده است (Incharoen and Yamauchi, 2009). این محققین علت بهبود عملکرد در استفاده از زنجبیل را به بهبود هیستولوژیکی ویلی‌ها و سلول‌های اپیتلیال روده نسبت دادند. مشابه با نتایج این تحقیق نشان داده شده که سطح یک درصد زنجبیل سبب بهبود فراسنجه‌های عملکردی مرغان تخم‌گذار شد ولی در سطح Malekizadeh *et al.*, 2012 سه درصد تاثیر معنی‌داری مشاهده نشد).

خوراک مصرفی روزانه تحت تاثیر افزودن زنجبیل قرار گرفت و با افزایش سطح زنجبیل از ۱ درصد به ۲ درصد مصرف خوراک به میزان ۲ گرم کاهش یافت ($P<0.05$). خوراک مصرفی تحت تاثیر افزودن فلفل و اثرات متقابل زنجبیل و فلفل قرمز قرار نگرفت. مشابه با نتیجه بدست آمده در این

جدول ۳- اثر متقابل فلفل قرمز و زنجبیل در جیره پس از تولک مرغان تخم‌گذار بر عملکرد تولیدی

Table 3. Interaction effects of red pepper powder root and ginger powder in post-molting diet of laying hens on production performance

Ginger (%)	Red pepper (%)	Egg production	Egg weight (g)	Egg mass (g)	Feed intake (g)
0% GRP ¹	0% RPP ²	67.16 ^f	62.67	42.09 ^b	101.7
1% GRP	0% RPP	71.84 ^d	62.11	44.62 ^b	103.83
2% GRP	0% RPP	74.69 ^{cb}	66.24	49.48 ^a	103.08
0% GRP	1% RPP	67.71 ^f	63.91	43.28 ^b	104.13
1% GRP	1% RPP	73.03 ^{cd}	65.34	47.72 ^a	103.7
2% GRP	1% RPP	76.63 ^a	64.49	49.42 ^a	102.9
0% GRP	2% RPP	69.66 ^e	64.09	44.65 ^b	105.5
1% GRP	2% RPP	75.43 ^{ab}	64.45	48.62 ^a	105.47
2% GRP	2% RPP	76.23 ^{ab}	64.69	49.32 ^a	100.91
SEM		0.58	0.65	1.83	1.11
P value		<0.01	0.56	<0.01	ns

Means within same column with different letters differ significantly ($P<0.05$). ns: non-significant.

1. Red pepper powder 2. Ginger root powder

تخم مرغ را در ۵۶ روز به میزان ۱۲۰ گرم و افزودن زنجبیل سبب بهبود تولید به میزان ۳۴۰ گرم شد. بهترین تاثیر زنجبیل در سطح صفر فلفل قرمز و کمترین تاثیر آن در سطح ۲ درصد فلفل قرمز مشاهده شد (۴۱۴ در مقابل ۴۱۶ گرم)، ولی بهترین تاثیر فلفل قرمز در سطح یک درصد زنجبیل و کمترین تاثیر آن در سطح دو درصد زنجبیل مشاهده شد (۲۲۴ در مقابل ۸ گرم). هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی تحت تاثیر سطوح فلفل قرمز قرار نگرفت، ولی افزودن زنجبیل و اثرات متقابل زنجبیل و فلفل تاثیر معنی داری بر این فرآنشجه داشتند ($P < 0.05$). کمترین هزینه تمام شده تخم مرغ در سطح ۲ درصد زنجبیل مشاهده شد.

اثر پودر فلفل قرمز و زنجبیل و اثرات متقابل آنها بر اینمی هومورال در جداول ۶ و ۷ نشان داده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح پودر فلفل قرمز در جیره، پاسخ سیستم اینمی هومورال افزایش یافته است، به طوری که بیشترین تیتر آنتی بادی کل، پس از تزریق گلبول قرمز گوسفنده در اثر ۲ درصد پودر فلفل قرمز در جیره مشاهده شد، همچنین تیتر ایمونو گلوبین M نیز در اثر ۲ درصد پودر فلفل قرمز جیره به صورت معنی داری بیشتر بود ($P < 0.05$). برای پودر زنجبیل نیز وضعیت تقریباً شبیه پودر فلفل قرمز بود فقط با این تفاوت که استفاده از پودر زنجبیل در جیره مرغ تخم گذار، تیتر آنتی بادی کل را در مقایسه با تیمارهای بدون زنجبیل فقط به صورت عددی افزایش داد ولی این افزایش معنی دار نبود. بالاترین تیتر آنتی بادی کل (۴/۵) مربوط به سطح ۲ درصد فلفل قرمز + ۲ درصد زنجبیل بود که در مقایسه با تیمار بدون افزودنی و همچنین در مقایسه با تیمارهایی که فقط پودر فلفل قرمز یا پودر زنجبیل در سطح ۲ درصد داشتند، اختلاف معنی داری داشت. این نتایج نشان داد که استفاده از مخلوط پودر فلفل قرمز و پودر زنجبیل، سطح اینمی هومورال را نسبت به تیمار بدون افزودنی افزایش داد. همچنین، نسبت به استفاده تکی آنها اثر هم افزایی وجود داشت ($P < 0.05$). برای ایمونو گلوبین M نیز وضعیت همانند ایمونو گلوبین کل بود ($P < 0.05$). مشابه با نتایج بدست آمده در این آزمایش گزارش شده است که

ضریب تبدیل خوراک کاهش یافت به طوری که سطح ۲ درصد زنجبیل به میزان ۰/۳۲ واحد، ضریب تبدیل خوراک را کاهش داد. اثرات متقابل زنجبیل و فلفل قرمز بر ضریب تبدیل خوراک معنی دار بود و کمترین ضریب تبدیل خوراک در اثر تیمار ۲ درصد زنجبیل و ۲ درصد فلفل قرمز و بیشترین ضریب تبدیل خوراک در اثر تیمار بدون افزودن مشاهده شد. اثر افزودن زنجبیل با سطوح مختلف فلفل بر ضریب تبدیل خوراک یکسان بود، ولی افزودن فلفل قرمز در سطح ۱ درصد زنجبیل بیشترین و در سطح ۲ درصد کمترین کاهش را در ضریب تبدیل ایجاد کرد. برخلاف نتیجه بدست آمده در این آزمایش که سطح ۲ درصد زنجبیل باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک شد، در تحقیق دیگری گزارش شد که استفاده از پودر زنجبیل تا سطح ۲ درصد تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک در مرغ های تخم گذار نداشته است (Zhao et al., 2011). همچنین در تحقیقی گزارش شد که استفاده از پودر زنجبیل و فلفل قرمز (در سطح ۰/۲ درصد) در جیره جوجه گوشته هیچ تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت (Moorthy et al., 2009). همچنین در تحقیق دیگری گزارش شده که استفاده از مخلوط پودر سیر و زنجبیل به ترتیب در سطح ۰/۵ و ۱/۵ هیچ تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک ندارد (Ademola et al., 2012).

علت بهبود ضریب تبدیل در جیره های حاوی زنجبیل می تواند به دلیل بهبود هیستولوژیکی ویلی ها و سلول های اپیتلیال روده و افزایش ترشح شیرابه های هضمی باشد (Incharoen and Yamauchi, 2009). مشابه با نتیجه بدست آمده در این آزمایش، گزارش شده که استفاده از پودر فلفل قرمز تا سطح ۴ درصد جیره هیچ تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت (Gurbuz et al., 2003). همچنین در آزمایش دیگری نتیجه گرفتند که استفاده از پودر فلفل قرمز تا سطح ۳۵/۲۶ میلی گرم در کیلوگرم جیره مرغ تخم گذار هیچ تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراکی ندارد (Gonzalez et al., 1999).

با توجه به جداول ۴ و ۵ مشاهده می شود وزن کل تخم مرغ تولیدی تحت تاثیر سطوح فلفل قرمز، زنجبیل و اثرات متقابل آنها قرار گرفت ($P < 0.05$). افزودن فلفل قرمز تولید

رامین ولی زاده و همکاران: اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی...

جدول ۴- اثر سطوح مختلف فلفل قرمز و زنجبیل در جیره پس از تولک مرغان تخمگذار بر ضریب تبدیل خوراک، وزن تخم مرغ تولیدی و هزینه خوراک مصرفی

Table 4. Effect of different levels of red pepper and ginger root powders in post-molting diet of laying hens on feed conversion ratio, total egg production weight and the cost of feed consumed

Ginger or red pepper (%)	Feed conversion ratio	Total egg production weight (g)	Feed cost to produce one kg egg (Rilas)
0 % RPP ¹	2.27	1271 ^b	2799
1 % RPP	2.22	1310 ^{ab}	2728
2 % RPP	2.19	1331 ^a	2695
SEM	0.03	15	37.92
P value	ns	0.03	ns
0 % GRP ²	2.39 ^a	1213 ^a	2942 ^a
1 % GRP	2.22 ^b	1315 ^b	2735 ^b
2 % GRP	2.07 ^c	1383 ^a	2546 ^c
SEM	0.03	15	37.92
P value	<0.01	<0.01	<0.01

Means within same column with different letters differ significantly ($P<0.05$). ns: non-significant.

1. Red pepper powder 2. Ginger root powder

جدول ۵- اثر متقابل فلفل قرمز و زنجبیل در جیره پس از تولک مرغان تخمگذار بر فراسنجه‌های اقتصادی

Table 5. Interaction effect of red pepper root powder and ginger root powder in post-molting diet of laying hens on economic parameters

Ginger levels (%)	Red pepper levels (%)	Feed conversion ratio	Total egg production weight (g)	feed cost to produce one kg egg (Rials)
0 % GRP ¹	0 % RPP ²	2.41 ^a	1178 ^b	2969 ^a
1 % GRP	0% RPP	2.33 ^{ab}	1249 ^b	2863 ^{ab}
2 % GRP	0 % RPP	2.08 ^c	1385 ^a	2566 ^c
0 % GRP	1 % RPP	2.4 ^a	1211 ^b	2955 ^a
1 % GRP	1 % RPP	2.17 ^{bc}	1336 ^a	2669 ^{bc}
2 % GRP	1 % RPP	2.08 ^c	1384 ^a	2560 ^c
0 % GRP	2 % RPP	2.36 ^a	1250 ^b	2901 ^a
1 % GRP	2 % RPP	2.17 ^{bc}	1361 ^a	2673 ^{bc}
2 % GRP	2 % RPP	2.04 ^c	1381 ^a	2512 ^c
SEM		0.05	26	65
P value		<0.01	<0.01	<0.01

Means within same column with different letters differ significantly ($P<0.05$). ns: non-significant.

1. Red pepper powder 2. Ginger root powder

۰/۵ درصد جیره جوجه گوشتی باعث بهبود تیتر آنتی‌بادی علیه ویروس نیوکاسل، قبل و بعد از واکسیناسیون می‌شود (آقایاری‌فر و همکاران، ۱۳۹۴). کپسایسین در روده سبب آزادسازی نوروپیتیدهایی مانند ماده P، نوروکینین A، پلی-پپتید روده و اسواکتیو و پپتید مرتبط با ژن کلستیتونین می-شود (Holzer, 1990). این نوروپیتیدها سبب فعالیت عضلات صاف، رشد و ترمیم بافت، فرآیندهای ایمنی‌زا و محافظت در برابر آسیب مخاطی دستگاه گوارش می‌شوند (Sterner and Szallasi, 1999). علاوه بر این، کپسایسین توانایی محافظت از میکرو ویلی را نشان می‌دهد زیرا باعث

استفاده از زنجبیل در جیره جوجه‌های گوشتی آلوده شده به سالمونلا سبب افزایش میزان اوزینوفیل، منوسيت و لفوسیت شد (Tavakol *et al.*, 2015). همچنین در تحقیقی گزارش شده که روغن فرار زنجبیل روی پاسخ سلوکی و ایمنی غیر اختصاصی لفوسیت T تأثیر می‌گذارد و ممکن است اثرات مثبتی در برخی شرایط بالینی مانند التهاب مزمن و بیماری‌های خودایمنی داشته باشد (Zhou *et al.*, 2015) مشابه با نتیجه بدست آمده در این آزمایش که سطح ۲ درصد فلفل قرمز سبب بهبود پاسخ ایمنی شد، در تحقیقی گزارش شد که استفاده از پودر فلفل قرمز در سطح

پرنده را ببود می‌بخشد احتمالاً می‌توان از این دو افزودنی در جیره به عنوان جایگزینی برای آنتی‌بیوتیک‌ها جهت پیشگیری از بیماری‌ها استفاده کرد.

کاهش چسبندگی اشرشیاکولی و کلسترییدیوم پرفیژن می‌شود (Best, 2000).

نتیجه‌گیری کلی

از نتایج این آزمایش می‌توان استنباط کرد که جهت ببود عملکرد تولیدی و همچنین تقویت سیستم ایمنی مرغ تخم‌گذار در جیره بر پایه گندم، می‌توان از فلفل یا زنجبل به میزان ۲ درصد یا مخلوط ۲ درصد زنجبل با یک درصد فلفل برای حصول نتیجه بهتر استفاده کرد. با توجه به اینکه استفاده از این دو افزودنی گیاهی در جیره، سیستم ایمنی

جدول ۶- اثر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز و زنجبل در جیره پس از تولک مرغان تخم‌گذار بر تیتر ایمونوگلوبولین کل، G و M علیه گلبول قرمز گوسفندي

Table 6. Effect of different levels of red pepper powder and ginger root powder post-molting diet of laying hens on titer of total immunoglobulin, immunoglobulin G and immunoglobulin M against sheep red blood cell

Ginger or Red pepper (%)	IgM	IgG	IgT
0 % RPP ¹	1.34 ^b	1.6	3 ^b
1 % RPP	1.66 ^b	1.5	3.16 ^b
2 % RPP	2.75 ^a	1.25	4 ^a
SEM	0.14	0.14	0.14
P value	0.0001	ns	0.0001
0 % GRP ²	1.58 ^b	1.58	3.16
1 % GRP	2.16 ^a	1.33	3.5
2 % GRP	2 ^{ab}	1.5	3.5
SEM	0.14	0.14	0.14
P value	0.02	ns	ns

Means within same column with different letters differ significantly ($P<0.05$). ns: non-significant.

1. Red pepper powder 2. Ginger root powder

جدول ۷- اثر متقابل فلفل قرمز و زنجبل در جیره پس از تولک مرغان تخم‌گذار بر تیتر ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین T بر علیه گلبول قرمز گوسفندي

Table 7. Interaction effect of red pepper powder and ginger root powder in post-molting diet of laying hens on production of immunoglobulin G, immunoglobulin M and immunoglobulin T against sheep red blood cell

Ginger (%)	Red pepper (%)	IgM (Log2)	IgG (Log2)	IgT (Log2)
0 % GRP ¹	0 % RPP ²	1 ^d	2	3 ^{cd}
1 % GRP	0% RPP	1 ^d	1.5	2.5 ^d
2 % GRP	0 % RPP	2 ^c	1.5	3.5 ^{bc}
0 % GRP	1 % RPP	1.5 ^{cd}	1.5	3 ^{cd}
1 % GRP	1 % RPP	2.5 ^{ab}	1.5	4 ^{ab}
2 % GRP	1 % RPP	1 ^d	1.5	2.5 ^d
0 % GRP	2 % RPP	2.25 ^{abc}	1.25	3.5 ^{bc}
1 % GRP	2 % RPP	3 ^a	1	4 ^{ab}
2 % GRP	2 % RPP	3 ^a	1.5	4.5 ^a
SEM		0.25	0.25	0.25
P value		<0.01	ns	<0.01

Means within same column with different letters differ significantly ($P<0.05$). ns: non-significant.

2. Ginger root powder 1. Red pepper powder

فهرست منابع

- آفایاری فر ب، ایلان، همتی ب، و م. ح. نعمتی. ۱۳۹۴. تاثیر پودر فلفل سیاه، سیر و زرد چوبه بر عملکرد و تیتر آنتیبادی علیه ویروس نیوکاسل جوجه‌های گوشته‌ی سویه کاپ (جنس نر). پژوهش‌های تولیدات دامی، ۱۶(۱): ۲۸-۳۴.
- Ademola S. G., Lawal T. E., Egbeawande O. O. and Farinu G. O. 2012. Influence of dietary mixtures of garlic and ginger on lipid composition in serum, yolk, performance of pullet growers and laying hens. International Journal of Poultry Science, 11: 196-201.
- Akbarian A., Golian A., Ahmadi A. S. and Moravej H. 2011. Effects of ginger root (*Zingiber officinale*) on egg yolk cholesterol, antioxidant status and performance of laying hens. Journal of Applied Animal Research, 39: 19-21.
- Annison G. and Choct M. 1991. Anti-nutritive activities of cereal non-starch polysaccharides in broiler diets and strategies minimizing their effects. World's Poultry Science Journal, 47: 232-242.
- Arkan B., Mohammed M., Rubaee A. M., Ali. A. and Jalil Q. 2012 Effect of ginger (*Zingiber officinale*) on performance and blood serum parameters of broiler. International Journal of Poultry Science, 11: 143-146.
- Best P. 2000: Health boosters from botany. Feed International, 6: 15-16.
- Bolu S. A., Aderibigbe S. A. and Elegebeleye E. A. 2014. Lesser known indigenous vegetables as potential natural egg yolk colourant in laying chickens. Animal Research International, 11: 2012-2017.
- Choct M., Hughes R. J., Trimble R. P., Angkanaporn K. and Annison G. 1995. Non-starch polysaccharide degrading enzymes increase the performance of broiler chickens fed wheat of low apparent metabolizable energy. Journal of Nutrition, 125: 485-92.
- Cogliani C., Goossens H. and Greko C. 2011. Restricting antimicrobial use in food animals. Lessons from Europe Microbe, 6: 274-279.
- Gonzalez M., Castano E., Avila E. and González de Mejía E. 1999. Effect of capsaicin from red pepper (*Capsicum sp*) on the deposition of carotenoids in egg yolk. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79: 1904-1908.
- Gurbuz Y., Yasar S. and Karaman M. 2003. Effects of addition of the red pepper from 4th harvest to corn or wheat based diets on egg-yolk colour and egg production in laying hens International Journal of Poultry Science, 2: 107-111.
- Herawati and Marjuki 2011. The effect of feeding red ginger (*Zingiber officinale Rosc*) as phytobiotic on broiler slaughter weight and meat quality. International Journal of Poultry Science, 10: 983-985 .
- Holzer P. 1990. Capsaicin as a tool for studying the sensory neuron functions. Advances in Experimental Medicine and Biology, 298: 3-15.
- Horowitz M., Wishart J., Maddox A. and Russo A. 1992. The effect of chilli on gastrointestinal transit. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 7: 52-56.
- Incharoen T. and Yamauchi K. 2009. Performance and histological changes of the intestinal villi in chickens fed dietary natural zeolite including plant extract. Asian Journal of Poultry Science, 3: 42-50.
- Koachere R. N., Ndip E. B., Chenwi L. M., Ndip T. E. and Njock D. N. 2002. Antibacterial effect of Zingiber officinale and Garcinia kola on respiratory tract pathogens. East African Medical Journal, 79(11): 588-592.
- Lee Y., Howard L. R. and Villalon B. 1995. Flavonoids and antioxidant activity of fresh pepper (*Capsicum annuum*) cultivars. Journal of Food Science, 60: 473-476.
- Lepage K. T., Bloom S. E. and Taylor R. L. 1996. Antibody response to sheep red blood cells in a major histocompatibility (B) complex aneuploid line of chickens. Poultry Science, 75: 346-350.
- Li H., Jin L., Wu F., Thacker P., Li X., You J. and Xu Y. 2012. Effect of red pepper (*Capsicum frutescens*) powder or red pepper pigment on the performance and egg yolk color of laying hens. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 25: 1605-1610.
- Lokaewmanee K., Yamauchi K. E., Komori T. and Saito K. 2010. Effects on egg yolk colour of paprika or paprika combined with marigold flower extracts. Italian Journal of Animal Science, 9: 356-359.
- Malekizadeh M., Moeini M. M. and Ghazi Sh. 2012. The effects of different levels of ginger (*Zingiber officinale Rosc*) and turmeric (*Curcuma longa Linn*) rhizomes powder on some blood metabolites and production performance characteristics of laying hens. Journal of Agriculture Science and Technology, 14: 127-134
- Moorthy M., Ravi S., Ravikumar M., Viswanathan K. and Edwin S. C. 2009. Ginger, pepper and curry leaf powder as feed additives in broiler diet. International Journal of Poultry Science, 8: 779-782.
- Paraksa N. 2011. The miracle of capsicum in animal production. Paper presented on the 3rd International Conference on sustainable animal agriculture for developing countries, Nakhon Ratchasima, Thailand.
- SAS Institute Inc. 2009. SAS/STAT User's Guide version 9.1, Edition. SAS, Cary, NC, USA.

- Steiner T. 2010. Phylogenics in animal nutrition natural concepts to optimize gut health and performance. Nottingham University Press, 192 pp.
- Sternér I. and Szallasi A. 1999. Novel natural vanilloid receptor agonists: new therapeutic targets for drug development. Trends in Pharmacological Sciences, 20: 459-465.
- Tavakol M., Khodaei H. and Nasr J. 2015. Ginger powder effect on the immune system in broilers exposed to *Salmonella* infection. Der Pharma Chemica, 7: 266-269.
- Wegener H. C., Aarestrup F. M., Gerner-Smidt P. and Bager F. 1999. Transfer of antibiotic resistant bacteria from animal to man. Acta Veterinaria Scandinavica, 92: 51-57.
- Zhang G. F., Yang Z. B., Wang Y., Yang W. R., Jiang S. Z. and Gai G. S. 2009. Effects of ginger root (*Zingiber officinale*) processed to different particle sizes on growth performance, antioxidant status, and serum metabolites of broiler chickens. Poultry science, 88: 2159-2166.
- Zhao X., Yang Z. B., Yang W. R., Wang Y., Jiang S. Z. and Zhang G. G. 2011. Effects of ginger root (*Zingiber officinale*) on laying performance and antioxidant status of laying hens and on dietary oxidation stability. Poultry science, 90: 1720-1727.
- Zhou H., Deng Y. and Xie Q. 2006. The modulatory effects of the volatile oil of ginger on the cellular immune response *in vitro* and *in vivo* in mice. Journal of Ethnopharmacology, 105: 301-305.



Interaction effect of ginger root and red pepper powders in wheat based diet on performance and immune response of layer hens in post-molting period

R. Valizadeh¹, R. Kianfar^{2*}, S. A. Mirghelenj², M. Olyae²

1. Ph.D Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2. Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

(Received: 24-10-2017 – Accepted: 24-12-2017)

Abstract

This experiment was conducted to investigate the interaction effects of ginger root and red pepper powders in wheat based diet on performance and immune response of layer hens. In this experiment 288 hy-line W-36 laying hens in post-molting phase (78 weeks) were assigned to 36 groups in a factorial arrangement with nine treatments and four replicates based on completely randomized design. The experimental factors were included three levels of red pepper (0, 1 and 2% of diet) and three levels of ginger root powder (0, 1 and 2% of diet). Results showed that pepper levels were significantly increased egg production and egg mass of birds ($P<0.05$). Ginger levels were significantly improved feed intake, egg production, egg mass and feed conversion ration during whole experimental period. Interaction effects of red pepper and ginger levels were significant on feed intake, egg production and egg mass ($P<0.05$). The highest feed intake, egg production and egg mass were obtained in diets including 2% red pepper+1% ginger, 1% pepper+2% ginger and 1% pepper+2% ginger, respectively. The highest egg weight was obtained from diets including 1% pepper+2% ginger. Main effects of pepper levels and interaction effects of pepper and ginger levels were significant ($P<0.05$) on IgM and IgT and the best immune response was obtained in diets containing 2% ppber+2% ginger. The overall results indicated that laying hens using 2% ginger root powder with 1% red pepper had the best effects on performance.

Keywords: Humeral immunity, Ginger, Red pepper, Performance traits, Laying hens

*Corresponding author: rkianfar@tabrizu.ac.ir