

اثر مقادیر مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم صنعتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

جلال سالاری^۱، محمد یگانه‌پرست^{۲*}، فاطمه صاحبی اعلا^۳، مجید کلانتر نیستانکی^۴

- ۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بولی سینا همدان
۲- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
۳- دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
۴- دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه شهرکرد و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

(تاریخ دریافت: ۹۲/۶/۲ - تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۵)

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثرات استفاده از کلریدآمونیوم (NH_4Cl) و کلریدپتاسیم (KCl) صنعتی در جیره دوره رشد (۲۲ تا ۴۲ روزگی) جوجه‌های گوشتی نر در شرایط تنش گرمایی تابستان استان قم (دمای ۲۳ تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد) انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۰ تیمار و ۴ تکرار و ۱۹ قطعه جوجه گوشتی نر در هر تکرار اجرا شد. جوجه‌ها به مدت ۲۱ روز در شرایط یکسان پرورش داده شدند و سپس به قفس‌های آزمایش منتقل شدند. تیمارها شامل شاهد بدون مکمل و سطوح ۰/۶ (KCl^{۰/۶}), ۰/۷ (KCl^{۰/۷}), ۰/۸ (KCl^{۰/۸}) و ۰/۹ (KCl^{۰/۹}) درصد KCl صنعتی و ۰/۳ (NH₄Cl^{۰/۳}), ۰/۴ (NH₄Cl^{۰/۴}), ۰/۵ (NH₄Cl^{۰/۵}) و ۰/۶ (NH₄Cl^{۰/۶}) درصد NH₄Cl صنعتی بودند. نتایج نشان داد افزایش وزن در تیمارهای KCl^{۰/۹} (۱۳۳۰/۸ g) و KCl^{۰/۷} (۱۳۰۶/۶ g) بیشتر از شاهد (g) (۱۱۸۷) بود ($P < 0.05$). ضریب تبدیل غذایی تیمار NH₄Cl^{۰/۶} (۱/۵۷) کمتر از شاهد (۱/۷۸) بود ($P > 0.05$). میزان هموگلوبین شاهد (۱۰/۱۹) کمتر از تیمارهای KCl^{۰/۸} (۱۱/۴۶ g/dl) و KCl^{۰/۹} (۱۱/۳۶ g/dl) بود ($P < 0.05$). بیشترین درصد هماتوکریت در تیمارهای KCl^{۰/۶} (۳۴/۱۹) و KCl^{۰/۹} (۳۴/۹۵) مشاهده شد ($P < 0.05$). تیتر آنتی بادی ضد نیوکاسل در روز ۳۲ پرورش در تیمار KCl^{۰/۹} (۲/۳۵) بیشتر از شاهد (۱/۳۷) بود ($P < 0.05$). نتایج نشان داد که افزودن الکتروولیت‌ها باعث کاهش اثرات منفی تنش گرمایی می‌شود و مقدار ۰/۸ و ۰/۹ درصد KCl بهترین نتایج را نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: تنش گرمایی، جوجه‌های گوشتی، کلریدآمونیوم، کلریدپتاسیم

مقدمه

محققین معتقدند که اثر مفید کلرید پتاسیم از طریق تامین یون پتاسیم نیست. محققین با تأمین مقدار معادلی از یون پتاسیم از طریق کلرید پتاسیم یا کربنات پتاسیم برای جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (۳۵ درجه سانتی گراد) در سنین ۵ تا ۸ هفتگی مشاهده کردند که مکمل کلرید پتاسیم در آب آشامیدنی، افزایش وزن جوجه‌ها را بهبود داد در حالیکه مکمل کربنات پتاسیم آنرا کاهش داد (Teeter and Smith, 1986). اثر کلرید آمونیوم در پایین آوردن pH خون، هم در حین تنش گرمایی و هم قبل از Smith and وقوع آن، مورد اتفاق نظر محققین است (Teeter, 1987, 1988). در آزمایشی بر جوجه‌های گوشتی که از ۴ هفتگی تحت دمای ثابت ۳۴/۲ درجه سانتی گراد پرورش یافته‌ند مشاهده شد که کلرید آمونیوم در سطح ۲۰ گرم در کیلوگرم جیره، عملکرد را کاهش می‌دهد (Abou-Ella and Ismail, 1999). افزودن ۲، ۳ و ۴٪ سدیم بیکربنات باعث افزایش معنی‌داری در مقدار گلوبولین، سدیم، کلسیم و فسفر در مقایسه با گروه شاهد شد ولی Hassan *et al.*, ۲۰۰۳ نداشت (Badran, 2003; 2011). با توجه به اینکه بیشتر نقاط کشور ما از لحاظ دمایی گرم‌سیر و نیمه گرم‌سیر است، تعادل اسید-باز خون طیور با اختلال مواجه می‌شود و به ناچار در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از توان طیور، صرف برقراری شرایط تعادل هموستاتیک خون می‌شود. با استفاده از نمک‌هایی چون کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم، می‌توان طیور را در بهبود مسیرهای متابولیکی لازم جهت حفظ توازن اسید-باز یاری کرده و لذا باعث بهبود عملکرد آنها شد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم صنعتی در جیره بر برخی از فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی است.

مواد و روش‌ها

تحقیق حاضر روی جوجه‌های گوشتی نر در مرحله رشد در شرایط تنش گرمایی طبیعی تابستان قم انجام شد. جوجه‌های گوشتی نر از آمیخته هوبارد که از شرکت سپید جوجه گیلان تهیه شده بودند، تا ۲۱ روزگی در یک گروه واحد پرورش یافتند و در آخرین روز دوره آغازین، جوجه‌ها پس از توزین با میانگین وزنی مشابه به واحدهای آزمایشی تخصیص یافتند (۲۲-۴۲ روزگی). در مدت آزمایش دمای

دمای محیطی بالا، از جمله جدی‌ترین عواملی است که بر عملکرد تولید جوجه گوشتی در مناطق گرمسیری تاثیر می‌گذارد و به دلیل کاهش عملکرد جوجه‌های گوشتی و افزایش مرگ و میر آنها، خسارات اقتصادی فراوانی به دنبال دارد. در شرایط دمای محیطی بالا با افزایش تعداد تنفس (له له زدن) بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی صرف خنک شدن پرنده می‌شود. تاثیر تنش گرمایی بر جوجه‌های گوشتی شامل افزایش دفع دی اکسید کربن و کاهش آن در خون، کاهش غلظت یون هیدروژن، ایجاد اختلال در توازن اسید-باز، بروز آلکالوز تنفسی یا پلاسمای قلبی، کاهش مصرف غذا، کاهش رشد، کاهش قدرت بقا، کاهش پروتئین ماهیچه‌ای، افزایش ذخیره سازی چربی، کاهش غلظت سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن، بیکربنات، روی، مولیبدن و مس در خون، کاهش هماتوکریت و رقیق‌تر شدن خون است (Ahmed and Sarwar, 2006). در دمای محیطی بالا افزایش سرعت تنفس، سبب کاهش فشار دی اکسید کربن خون می‌شود و در نتیجه، غلظت بیکربنات، بخاطر افزایش دفع بیکربنات و کاهش دفع هیدروژن بوسیله کلیه‌ها، برای حفظ تعادل اسیدی در پرندگان، کم می‌شود که این پدیده، آلکالوز تنفسی نامیده می‌شود (Naseem *et al.*, 2005). یکی از راه حل‌های ممکن، علاوه بر سیستم‌های خنک کننده، استفاده از مواد شیمیایی است که می‌تواند در فاکتورهای خونی تعديل ایجاد نموده و از اختلالات مربوطه جلوگیری کند. کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم به عنوان افزودنی‌های فیزیولوژیک نقش مهمی را در تنظیم فشار خون، تعادل شیمیایی اسید-باز و مقابله با تنش گرمایی بازی می‌کنند. تنش گرمایی غلظت پتاسیم پلاسمای طیور را کاهش داده و دفع پتاسیم از طریق ادرار را افزایش و ذخیره پتاسیم بدن را کاهش می‌دهد (Ait-Boulahsen *et al.*, 1995)، به همین دلیل بسیاری از محققین، مقدار پتاسیم توصیه شده به وسیله NRC برای جوجه‌های گوشتی را در شرایط تنش گرمایی کافی ندانسته‌اند و مقدادی بیشتری را توصیه کرده‌اند. برای مثال در شرایط تنش گرمایی مزمن برای پیشگیری از عدم توازن پتاسیم، سطوح جیره ای ۰/۶ درصد برای مرغان تخم‌گذار و ۱/۵ درصد برای جوجه‌های گوشتی پیشنهاد شده است (Ait-Boulahsen *et al.*, 1995). برخی

دقیقه سانتریفیوژ شدند. برای اندازه‌گیری سدیم، پتانسیم و کلر از روش Ion Selective Electrode (ISE) بوسیله دستگاه Electrolyte Analyze (caretium) (XI-۹۲۱E). مقادیر کلسیم و فسفر نیز با استفاده از روش اسپکتوفوتومتری محاسبه شد. برای شمارش سلول‌های خونی از شمارشگر اتوماتیک Cell Counter (مدل دستگاه: ERMA ساخت کشور ژاپن) استفاده شد (post *et al.*, 2003; ساستری، ۱۳۷۱). در روز ۷ آزمایش جوجه‌ها واکسن دوگانه نیوکاسل + آنفلوانزا را به ترتیب بصورت آشامیدنی و تزریقی و در روز ۱۱ و ۱۶ واکسن نیوکاسل را بصورت آشامیدنی دریافت کردند. در روز ۱۴ و ۳۲ خونگیری به ترتیب به منظور تعیین تیتر آنتی‌بادی آنفلوانزا و نیوکاسل از ورید بال انجام شد (Van Zijpp and Leenstra., 1980). تیتر آنتی‌بادی بیماری‌های نیوکاسل و آنفلوانزا با استفاده از کیت‌های SERELISA® Rabies و OVATEC® Plus شرکت Synbiotic و با استفاده از دستگاه الایزا اندازه‌گیری شدند (Hassan *et al.*, 2011). برای اندازه‌گیری گازهای خون از دستگاه IVL۹۹۵۰ ساخت کشور سوئیس استفاده شد. میزان ۰/۵ سی‌سی نمونه در دستگاه ریخته شد و در زمان ۵۰ ثانیه تا یک دقیقه مقدار گازها اندازه‌گیری و ثبت شد.

حداقل و حداکثر روزانه سالن آزمایشی ثبت شد. میانگین دمای جداکثر دوره آزمایش ۳۴/۷ درجه سانتی‌گراد بود و جداکثر دمای دوره آزمایش علیرغم استفاده از کولرهای آبی و هواکش به ۴۱ درجه سانتی‌گراد نیز رسید. میانگین دمای حداقل دوره آزمایش ۲۵/۹ درجه سانتی‌گراد بود. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۱۰ تیمار، ۴ تکرار و ۱۹ قطعه جوجه گوشتی نر در هر واحد آزمایشی بود. جیره مورد استفاده بر اساس جدول NRC (1994) تنظیم و اجزا و ترکیب جیره در جدول ۱ ارائه شده است. تیمارها شامل تیمار شاهد و سطوح ۰/۶، ۰/۷، ۰/۸ و ۰/۹ درصد NH₄Cl صنعتی و ۰/۳، ۰/۴، ۰/۵ و ۰/۷ درصد KCl صنعتی بودند. در این آزمایش، صفات عملکردی شامل میزان خوارک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی بطور هفتگی اندازه‌گیری شده و با در نظر گرفتن میزان تلفات هر واحد آزمایشی (به روش روز- مرغ) میزان افزایش وزن و خوارک مصرفی، تصحیح شد و سپس ضریب تبدیل غذایی برای همه واحدهای آزمایشی تعیین شد. در زمان کشتار (۴۲ روزگی) برای تهیه نمونه‌های خونی از رگ زیر بال (۳ نمونه از هر تکرار) خون‌گیری به عمل آمد. نمونه‌های خون در لوله‌های آزمایش حاوی هپارین ریخته و پس از اتمام خونگیری به آزمایشگاه انتقال داده شد. نمونه‌های خون با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه و به مدت ۵

جدول ۱- ترکیب جیره‌های آغازین و رشد (%)

Table 1. Composition of starter and grower basal diets (%)

Ingredient (%)	Starter (0 to 21 days)	Grower (22 to 42 days)
Corn grain	53.89	54.66
Soybean meal 44%	40.94	38.15
Soybean oil	1.00	3.00
Oyster shell	1.60	1.60
Dicalcium phosphate	1.72	1.70
Salt	0.30	0.30
DL-Methionine	0.04	0.04
L-Lysine - HCl	0.01	0.09
Mineral premix ¹	0.25	0.25
Vitamin premix ²	0.25	0.25
Total (%)	100	100
Calculated		
ME(Kcal/kg)	3000	3100
Protein (%)	23.00	21.54
Calcium (%)	1.00	0.93
Available Phosphorus (%)	0.45	0.45

Mineral premix (concentration per kg); Mn (oxide) 64 g; Zn (oxide) 44 g; Fe (sulfate) 100 g; Cu (sulfate) 16 g; I (Calcium iodate) 0.64 g; Co 0.2 g and Se (1%) 8 g. Vitamin premix (Concentration per kg); Vitamin A, 7.2 g; Vitamin D, 7g; Vitamin E; 14.4g; Vitamin K₃, 1.6 g; B₁, 3.3g; B₂, 0.72g; Pantothenic acid, 12g; B₃, 12160 mg, Pyridoxine, 6.2, mg, B₁₂ 0.6g; Choline chloride, 440 mg.

سطح بالایی از یون پتاسیم از طریق کلرید پتاسیم تامین شود pH بالای خون هیچ اثر نامطلوبی بر افزایش وزن یا بازده غذا ندارد (Whiting *et al.*, 1991). با کاربرد آب آشامیدنی حاوی ۰/۴۸ درصد کلرید پتاسیم برای جوجه‌های گوشتی تحت تنفس گرمایی، مشاهده شد که علیرغم pH قلیایی و کاهش غلظت گاز دی اکسید کربن خون، رشد ۲۰ درصد افزایش یافت (Teeter and Smith, 1987). لذا نتیجه‌گیری شد که علاوه بر pH و غلظت دی اکسید کربن خون، عوامل دیگری نیز در پاسخ فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی به تنفس گرمایی، موثرند که به نظر می‌رسد مهمترین عامل، میزان مصرف آب است و اثرات مفید کلرید پتاسیم نیز از طریق افزایش دادن مصرف آب است. استفاده از ۰/۵ و ۱ درصد کلرید پتاسیم در جیره جوجه‌های گوشتی نر در فصل تابستان از ۲۱ تا ۴۹ روزگی وزن زنده، مصرف دان، رطوبت بستر و نسبت آب به دان را در گروههای مصرف کننده کلرید پتاسیم بطور معنی‌داری افزایش داد (Borges *et al.*, 2000). در ارتباط با کاربرد کلرید پتاسیم، گزارش‌های متعددی مبنی بر عدم مشاهده اثر مثبت ناشی از مصرف مکمل کلرید پتاسیم در شرایط تنفس گرمایی وجود دارد. علت این تفاوتات می‌تواند وجود تفاوت‌هایی در نوع، میزان و شدت تنفس گرمایی اعمال شده، تفاوت در سویه‌ها و جنس جوجه‌های گوشتی مورد استفاده و تفاوت‌های فیزیولوژیکی آنها و میزان و نحوه مصرف کلرید پتاسیم باشد.

شاخص‌های خونی، نسبت به تغییرات فشار و دما حساس هستند و یک عامل فیزیولوژیکی مهم در بدن پرندگان به شمار می‌روند. نتایج جدول ۳ نشان داد که سطح هموگلوبین خون در تیمارهای حاوی الکترولیت بالاتر از تیمار شاهد بود که این افزایش در تیمارهای KCl_{۰/۹}, NH_۴Cl_{۰/۷} و KCl_{۰/۸} معنی‌دار بود. همچنین افزایش معنی‌داری بین سطوح KCl_{۰/۸} و KCl_{۰/۹} با سطح NH_۴Cl_{۰/۳} مشاهده شد. درصد هماتوکریت در تیمار شاهد کمترین مقدار بود که اختلاف آن با تیمارهای KCl_{۰/۸}, KCl_{۰/۹} و KCl_{۰/۶} معنی‌دار بود. همچنین تیمارهای KCl_{۰/۸} و KCl_{۰/۹} افزایش معنی‌داری را نسبت به تیمارهای NH_۴Cl_{۰/۳} و NH_۴Cl_{۰/۴} نشان دادند. تغییرات شکلی کمی در سلول‌های خونی مرتبط با گرما وجود دارد و بوسیله تغییراتی که در هماتوکریت، تعداد

در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS (2004) و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد بررسی قرار گرفت. مدل آماری این طرح که در آن دو نمونه از هر تکرار برداشت شد بصورت $Y_{ijk} = \mu + T_i + e_{ij} + Se_{ijk}$ بود که μ مقدار هر مشاهده، T_i میانگین مشاهدات، e_{ij} اثر تیمار، Se_{ijk} اثر اشتباه آزمایشی و e_{ijk} اثر اشتباه نمونه برداری است.

نتایج و بحث

با توجه به نتایج جدول ۲ هیچ تفاوت معنی‌داری در بین گروههای آزمایشی برای خوارک مصرفی مشاهده نشد ($P > 0/05$). مقایسه میانگین‌های مربوط به افزایش وزن جوجه‌های گوشتی نشان داد تیمارهای KCl_{۰/۹} و NH_۴Cl_{۰/۷} نسبت به گروه شاهد افزایش وزن بیشتری داشتند ($P < 0/05$). ضریب تبدیل غذایی گروه دریافت کننده NH_۴Cl_{۰/۶} به طور معنی‌داری کمتر از شاهد بود ($P < 0/05$). استفاده از مکمل کلرید آمونیم عنوان یک اسیدی کننده بالقوه خون مورد توجه قرار گرفته است. اثر کلرید آمونیم در پایین آوردن pH خون، هم در حین تنفس گرمایی و هم قبل از وقوع آن، مورد اتفاق نظر محققین است (Smith and Teeter, 1988, 1987). گزارش شده است که افزودن ۱ درصد کلرید آمونیم به جیره پایه جوجه‌های گوشتی تحت تنفس گرمایی، موجب بهبود افزایش وزن به میزان ۲۵ درصد شده است (Teeter *et al.*, 1985). در مطالعه‌ای دیگر ارائه جیره حاوی ۱ درصد کلرید آمونیوم یا آب آشامیدنی حاوی ۰/۳ درصد کلرید آمونیم به جوجه‌های گوشتی ۱ تا ۴۹ روزه تحت دمای محیطی ۳۹ تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد، بر میزان افزایش وزن، میزان خوارک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی‌داری نداشت (Silva and Flemming, 1991). اثر منفی کلرید آمونیم بر رشد جوجه‌های گوشتی نیز در مواردی گزارش شده است (Teeter and Smith, 1986). در بیان علت مشاهده تفاوت بین گزارش‌های گوشتی تحقیقی به نظر می‌رسد که بیش از همه چیز، سطح مصرف کلرید آمونیم نقش داشته باشد زیرا زیاد بودن سطح مصرف آن منجر به کاهش زیاد pH خون شده و بر توان تولید اثر منفی خواهد داشت. در رابطه با اثر کلرید پتاسیم بر pH خون و توازن اسید-باز، مشاهده شده که کلرید پتاسیم قادر به اصلاح pH خون نیست ولی وقتی

جدول ۲- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی نر در دوره رشد (۲۲-۴۲ روزگی)
Table 2. Effect of experimental diets on performance of male broiler in grower period (22-42 d)

Treatment	FI ¹ (g)	BWG ² (g)	FCR ³
Control	2113	1187.8 ^c	1.78 ^a
KCl 0.6%	2126.2	1205.2 ^{bc}	1.77 ^a
KCl 0.7 %	2446.8	1270.5 ^{abc}	1.68 ^{ab}
KCl 0.8 %	2126.3	1283.2 ^{abc}	1.66 ^{ab}
KCl 0.9 %	2255.0	1330.8 ^a	1.69 ^{ab}
NH ₄ Cl 0.3%	2042.8	1232.7 ^{abc}	1.66 ^{ab}
NH ₄ Cl 0.4%	2287.0	1282.5 ^{abc}	1.78 ^a
NH ₄ Cl 0.5%	2163.4	1234.9 ^{abc}	1.75 ^a
NH ₄ Cl 0.6%	2025.1	1298.9 ^{abc}	1.57 ^b
NH ₄ Cl 0.7%	2168.1	1306.6 ^{ab}	1.66 ^{ab}
P value	0.1	0.0001	0.0005
SEM	31.45	42.27	0.01

^{a-c} Different superscripts within a column indicate significant differences between treatments ($P<0.05$).¹ Feed intake. ² Body weight gain. ³ Feed conversion ratio.

جدول ۳- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول‌های خونی در دوره رشد (۲۲-۴۲ روزگی)
Table 3. Effect of experimental diets on blood cell count in grower period (22-42 d)

Treatment	Hemoglobin (g/dl)	Hematocrit (%)	Heterophile (%)	Lymphocyte (%)	Heterophile/Lymphocyte
Control	10.19 ^d	31.73 ^d	45.79 ^a	51.82 ^d	0.88 ^a
KCl 0.6%	10.44 ^{dc}	34.19 ^{abc}	45.48 ^a	51.31 ^d	0.88 ^a
KCl 0.7 %	10.82 ^{bed}	33.58 ^{abcd}	42.61 ^{bc}	54.78 ^b	0.78 ^c
KCl 0.8 %	11.46 ^{ab}	34.95 ^{ab}	43.14 ^b	53.46 ^c	0.80 ^c
KCl 0.9 %	11.83 ^a	34.99 ^a	41.61 ^c	55.88 ^a	0.74 ^d
NH ₄ Cl 0.3%	10.25 ^{cd}	32.45 ^{cd}	43.36 ^b	51.77 ^d	0.83 ^b
NH ₄ Cl 0.4%	10.56 ^{bed}	32.37 ^{cd}	42.98 ^{bc}	51.52 ^d	0.83 ^b
NH ₄ Cl 0.5%	11.13 ^{abc}	33.10 ^{bed}	42.91 ^{bc}	53.80 ^c	0.79 ^c
NH ₄ Cl 0.6%	10.82 ^{bcd}	33.25 ^{abcd}	42.51 ^{bc}	53.39 ^c	0.79 ^c
NH ₄ Cl 0.7%	11.36 ^{ab}	33.48 ^{abcd}	42.04 ^{bc}	53.74 ^c	0.78 ^c
P value	0.002	0.004	<0.0001	<0.0001	<0.0001
SEM	0.27	0.57	0.42	0.31	0.008

^{a-d} Different superscripts within a column indicate significant differences between treatments ($P<0.05$).

عرض گرمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته بودند، مشاهده نکردن (جدول ۳).

در مطالعه حاضر درصد هتروفیل در تیمارهای حاوی کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم کاهش یافت و تنها تیمار KCl اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نداشت. کمترین درصد لنسفوسیت نیز در تیمار شاهد، KCl، NH₄Cl. ۰/۷ و NH₄Cl. ۰/۴ مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها داشتند. یکی از واکنش‌های فیزیولوژیکی برای قرار گرفتن در عرض فشار گرما، آزادسازی گلوکورتیکوئید است که منجر به تشکیل بافت لنفاوی می‌شود، مقدار هتروفیل رها شده بوسیله مغز استخوان، افزایش می‌یابد و فعالیت‌های ماکروفاژی کاهش می‌یابد. در نتیجه افزایش هتروفیل و کاهش لنسفوسیت، نسبت هتروفیل به لنسفوسیت

گلبول‌های سفید مدور، مقدار هموگلوبین (Hb) و اریتروسیت خون به وجود می‌آید، مشخص می‌شود. محققین گزارش کردند که افزودن بیکربنات سدیم و کلرید پتاسیم به آب آشامیدنی درصد هموگلوبین را در شرایط تنفس گرمایی افزایش می‌دهد (Gened, 2000). کاهش یافتن مقدار هموگلوبین و افزایش حجم لکوسیت در جوجه‌ها، با خاطر افزایش تدریجی دمای محیطی است (Vecerek et al., 2002). جوجه‌های گوشتی نر، زمانی که در عرض دمای محیطی بالا قرار می‌گیرند، مقدار هماتوکریت و هموگلوبین خون آنها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد (Bedanova et al., 2003) در حالی که هماتوکریت در جوجه‌های گوشتی نر ۴۴ روزه که در Altan et al. (2000) هیچ گونه تغییری را در مقدار هماتوکریت در جوجه‌های گوشتی نر ۴۴ روزه که در

بالای کلر در گروه مصرف کننده الکتروولیت به علت تجزیه و آزادسازی یون کلر بعد از دهیدراسيون در بدن افزایش می‌یابد که با نتایج (Boulahsen *et al.*, 1995) و آرشامی و حسابی نامعنی (Subbarao and Glick, 1973) مطابقت داشت.

پرنده‌گانی که در معرض دمای زیاد قرار می‌گیرند، به وسیله افزایش سرعت تنفس، از خودشان عکس العمل نشان می‌دهند که این عمل، سبب کاهش فشار دی اکسید کربن خون می‌شود و در نتیجه، غلظت بیکربنات، بخار افزایش دفع بیکربنات و کاهش دفع هیدروژن بوسیله کلیه‌ها، برای حفظ تعادل اسیدی در پرنده‌گان، کم می‌شود (Borges *et al.*, 2003). قرار گرفتن در شرایط تنفس گرمایی، منتج به کاهش دی اکسیدکربن، افزایش pH خون و کاهش مقدار بیکربنات و کاتیون‌ها، به ویژه پتاسیم در ادرار می‌شود (Ahmed and Sarwar, 2006). از دست دادن دی اکسیدکربن، باعث می‌شود که غلظت هیدروژن (H^+) کاهش یابد و باعث افزایش pH پلاسمما شود (Borges *et al.*, 2003). در پژوهش حاضر نتایج جدول ۵ نشان می‌دهد که افزایش سطوح الکتروولیت در جیره باعث کاهش اسیدیته خون می‌شود به طوریکه تیمارهای KCl_{۰/۸} با بیشترین KCl_{۰/۹} و KCl_{۰/۱۰}، NH_۴Cl_{۰/۷}، NH_۴Cl_{۰/۶}، NH_۴Cl_{۰/۵} سطوح الکتروولیت کمترین مقدار اسیدیته را نشان دادند. طبق نتایج Ahmad *et al.* (2005) کاهش اسیدیته خون ممکن است با خاصیت اسیدی الکتروولیتها مرتبط باشد به ویژه در مورد کلرید آمونیوم که با تولید یون‌های H^+ برای رفع آلکالوز ایجاد شده تحت تنفس گرمایی عمل نموده است که این امر با نتایج سایر محققین مطابقت دارد (Deyhim and Teeter, 1991). فشار اکسیژن و دی اکسید کربن تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$).

استرس گرمایی باعث کاهش تیتر آنتی بادی نیوکاسل در تیمار شاهد و افزایش آن در تیمار KCl_{۰/۹} شد. تیتر آنتی بادی آنفولانزا تفاوت معنی‌دار را نشان نداد (جدول ۶). گزارش شده که قرار دادن جوجه‌ها در معرض گرمای بالا و مداوم، باعث کاهش واکنش مقاومتی آنها می‌شود. هنگامی که پرنده‌گان در معرض دمای محیطی بالا قرار می‌گیرند، ترکیب پادتن‌های خون (آنتی بادی‌ها) آنها کم می‌شود (Subbarao and Glick, 1973).

تغییر می‌کند و به عنوان یک مقیاس حساس و قابل اعتماد برای اندازه‌گیری تنفس گرما در جوجه‌های گوشته به کار می‌رود. تعدادی از محققین بیان کردند که افزایش نسبت هتروفیل به لنفوسيت، بخار افزایش دید گرما در Zulkifli *et al.*, 1994; Altan *et al.*, 2000 در طول مدت تنفس گرمایی، نسبت هتروفیل به لنفوسيت افزایش می‌یابد، زیرا کاهش تعداد لنفوسيت، Bedanova *et al.*, 2003 باعث افزایش تعداد هتروفیل می‌شود (Bedanova *et al.*, 2003). در این مطالعه سطح ۰/۹ درصد کلرید پتاسیم باعث کاهش معنی‌دار این نسبت در مقایسه با تیمار شاهد شد (جدول ۳).

مقدار الکتروولیت‌های موجود در خون در جدول ۴ گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که مقدار سدیم در تیمارهای KCl_{۰/۸} و KCl_{۰/۹} بیشترین مقدار را نسبت به تیمارهای دیگر داشته است. بیشترین سطح پتاسیم در تیمار KCl_{۰/۹} مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای KCl_{۰/۷} و KCl_{۰/۸} نداشت. سطح کلر نیز در تیمارهای KCl_{۰/۷}، KCl_{۰/۸} و KCl_{۰/۹} بیشترین و در تیمارهای شاهد، KCl_{۰/۶} و NH_۴Cl_{۰/۴} کمترین بود. طی یک آزمایش روی جوجه‌های گوشته ۵۰ روزه تحت تنفس گرمایی مشاهده شد که با افزایش درجه حرارت، pH خون افزایش و میزان کلسیم پلاسمما بین ۴۰–۵۰ درصد کاهش یافت و مصرف محلول ۰/۳ درصد کلرید پتاسیم بر میزان کلر پلاسمما اثری نداشت، اما محلول ۰/۹ درصد باعث افزایش آن شد (Boulahsen *et al.*, 1992). نتایج این پژوهش با نتایج Naseem *et al.* (2005) مطابقت داشت. کاهش پتاسیم در خون در شرایط استرس گرمایی می‌تواند به دلیل انتقال یونهای پتاسیم بین سلول‌ها و مایع خارج سلولی، افزایش دفع کلیوی پتاسیم، افزایش بازجذب به وسیله اریتروسیت‌ها و یا پوست، کاهش رقابت بین یون‌های H^+ و K^+ برای دفع کلیوی و در نتیجه افزایش پتاسیم ادراری است (Recce *et al.*, 2000). به طورکلی کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم سبب افزایش پتاسیم سرم خون در جوجه‌ها شده است ($P < 0.05$). مطالعات نشان می‌دهد که ایجاد حالت اسیدی در خون موجب خارج شدن یون پتاسیم از سلول و افزایش آن در خون می‌شود (Boulahsen *et al.*, 1995). غلظت یون کلر در گروه‌های دریافت کننده الکتروولیت بیشتر از گروه شاهد است. میزان

جدول ۴- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر مقدار الکترولیت‌های خون در دوره رشد (۲۲-۴۲ روزگی)

Table 4. Effect of experimental diets on blood electrolytes in grower period (22-42 d-old)

Treatment	Na (mEq/l)	K (mEq/l)	Cl (mEq/l)	HCO ₃ ⁻ (mEq/l)	Ca (mg/dl)	P (mg/dl)
Control	139.41 ^d	4.97 ^c	92.71 ^c	24.16	10.30	3.60
KCl 0.6%	140.82 ^{cd}	5.08 ^{bc}	95.93 ^{bc}	24.39	10.64	3.57
KCl 0.7 %	143.60 ^b	5.51 ^{abc}	115.52 ^a	24.29	10.56	3.96
KCl 0.8 %	151.90 ^a	5.73 ^{ab}	116.97 ^a	24.40	10.64	3.83
KCl 0.9 %	125.41 ^a	5.95 ^a	118.01 ^a	24.82	10.87	3.97
NH ₄ Cl 0.3%	140.51 ^{cd}	4.96 ^c	97.17 ^b	24.11	10.77	4.12
NH ₄ Cl 0.4%	141.61 ^{bcd}	5.23 ^{bc}	94.88 ^{bc}	24.35	10.44	3.72
NH ₄ Cl 0.5%	142.02 ^{bcd}	5.35 ^b	96.73 ^b	24.62	10.40	4.11
NH ₄ Cl 0.6%	141.66 ^{bcd}	5.06 ^b	97.63 ^b	24.93	10.90	4.08
NH ₄ Cl 0.7%	142.48 ^{bc}	5.26 ^b	97.25 ^b	24.85	10.60	3.97
P value	<0.0001	0.02	<0.0001	0.91	0.67	0.13
SEM	0.81	0.20	1.07	0.45	0.23	0.15

^{a-d} Different superscripts within a column indicate significant differences between treatments ($P<0.05$).

جدول ۵- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر مقدار گاز و اسیدیته خون در دوره رشد (۲۲-۴۲ روزگی)

Table 5. Effect of experimental diets on blood gas and pH in grower period (22 to 42 days)

Treatment	pH	O ₂ (mmHg)	CO ₂ (mmHg)
Control	7.90 ^a	92.50	43.87
KCl 0.6%	7.80 ^{ab}	93.50	43.96
KCl 0.7 %	7.35 ^{cd}	92.76	44.08
KCl 0.8 %	7.30 ^d	94.28	43.87
KCl 0.9 %	7.20 ^d	93.92	44.00
NH ₄ Cl 0.3%	7.87 ^a	94.15	43.74
NH ₄ Cl 0.4%	7.60 ^{bc}	90.52	44.05
NH ₄ Cl 0.5%	7.30 ^d	94.42	43.82
NH ₄ Cl 0.6%	7.27 ^d	94.91	43.84
NH ₄ Cl 0.7%	7.30 ^d	93.95	43.92
P value	<0.0001	1.000	0.99
SEM	0.08	3.28	0.66

^{a-d} Different superscripts within a column indicate significant differences between treatments ($P<0.05$).

جدول ۶- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا

Table 6. Effect of experimental diets on antibody titers against avian Newcastle and Influenza diseases in grower period

Treatment	Newcastle diseases titers	Influenza diseases titers
Control	1.37 ^c	3.35
KCl 0.6%	1.64 ^{bc}	3.48
KCl 0.7 %	1.56 ^{bc}	3.47
KCl 0.8 %	1.49 ^{bc}	3.72
KCl 0.9 %	2.35 ^a	3.96
NH ₄ Cl 0.3%	1.51 ^{bc}	3.37
NH ₄ Cl 0.4%	1.74 ^{bc}	3.38
NH ₄ Cl 0.5%	1.79 ^b	3.64
NH ₄ Cl 0.6%	1.47 ^{bc}	3.92
NH ₄ Cl 0.7%	1.68 ^{bc}	3.95
P value	0.0003	0.06
SEM	0.12	0.17

^{a-d} Different superscripts within a column indicate significant differences between treatments ($P<0.05$).

Khatak *et al.* (2012) و Mashaly *et al.* (2004) با نتایج همخوانی داشت.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق سطح ۰/۸ و ۰/۹ درصد کلرید پتاسیم صنعتی در جیره دوران رشد جوجه‌های گوشتی قابلیت کاهش اثرات منفی تنفس گرمایی را دارند.

در یک مطالعه مشاهده شد تیتر آنتی‌بادی علیه سلول‌های قرمز خون گوسفندی در جوجه‌های گوشتی که ۲۴ ساعت در معرض گرما قرار گرفته بودند در روز سوم پس از تزریق کاهش یافت (Regnier *et al.*, 1980). در آزمایشی دیگر، هنگامی که پرنده‌گان به مدت ۵ روز در دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گرفتند، آنتی‌بادی‌ها برای نفوذ الکتروولیت‌ها کاملاً بالاتر از حد کنترل پرنده‌گان بودند (Regnier and Kelley, 1981). نتایج پژوهش حاضر

فهرست منابع

- آرشامی ج. و حسابی نامگی ع. ر. ۱۳۷۷. اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم، کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم+کلرید پتاسیم بر الکتروولیت‌ها، pH خون و میزان تلفات در جوجه‌های گوشتی تحت تنفس حرارتی حاد. مجله علوم کشاورزی ایران، ۲۹(۲): ۳۴۳-۳۳۵
- ساستری ک. آ. ۱۳۷۱. ترجمه مجابی ع. مرادی ا.، کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، چاپ اول، انتشارات سازمان دامپزشکی، صفحه ۲۹-۳۹، ۸۷: ۲۹-۳۹
- Abou-El-Ella M. A. and Ismail A. M. 1999. Ascorbic acid, sodium bicarbonate and ammonium chloride supplementation in broiler diets at high environmental temperatures. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds, 2: 581 – 591.
- Ahmed T. and Sarwar M. 2006. Dietary electrolyte balance: implications in heatstressed broilers. World Poultry Science Journal, 62: 638-653.
- Ait-Boulahsen A., Garlich J. D. and Edens F.W. 1995. Potassium chloride improves the thermotolerance of chickens exposed to acute heat stress. Poultry Science, 74: 75–78.
- Altan O., Altan A., Cabuk M. and Bayraktar H. 2000. Effects of heat stress on some blood parameters in broilers. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24: 145-148.
- Badran A. M. M. 2003. Effect of Sodium bicarbonate supplementation on laying performance and physiological parameters during hot weather. M.Sc. Thesis Faculty of Agriculture, Cairo University.
- Bedanova I., Voslarova E., Vecerek V., Strakova E. and Suchy P. 2003. The hematological profile of broilers under acute and chronic heat stress at $30 \pm 1^\circ\text{C}$ leve. Folia Veterinaria, 47: 188-192.
- Borges S. A., Ariki J., Morae V. M. B., Pedroso A., Salvador D. and Martins C. L. 2000. Potassium chloride supplementation in broilers diets during summer. Ars Veterinaria, 16: 64-70.
- Boulahsen A. B., Garlich A. and Edens J. D. 1992. Relationship between blood ionized calcium and body temperature of chickens during acute heat stress. 19th World's poultry congress, 2: 87-92.
- Boulahsen A., Garlich J. D. and Edens F.W. 1995. Potassium chloride improves the thermotolerance of chickens exposed to acute heat stress. Poultry Science, 74:75-87.
- Deyhim F and Teeter R. G. 1991. Sodium and potassium chloride drinking water supplementation effects on acid-base balance and plasma corticosterone in broilers in thermoneutral and heat-distressed environments. Poultry Science, 70: 2551-2553.
- Dobrzański Z., Opaliński S., Hoffmann K., Bubel F. and Pogoda-Sewerniak K. 2011. Effect of different feed phosphates on blood plasma mineral profile in laying hens, EJPAU 14(4).
- Genedi D. M. M. 2000. The role of some anti- stressors on layer performance during hot climate conditions. M.Sc. Thesis Faculty of Agriculture, Cairo University.
- Hassan M. S. H., El-Sayed O. A. and Namera M. M. M. 2011. Effect of dietary sodium bicarbonate and potassium chloride supplementation on acid-base balance, plasma electrolytes and aldosterone hormone of golden montazah hens under hot climate condition. Egyptian Poultry Science, 31: 285-303.
- Khattak F. M., Acamovic T., Sparks N., Naseer Pasha T., Joiya M. H., Hayat Z. and Ali Z. 2012. Comparative efficacy of different supplements used to reduce heat stress in broilers. Pakistan Journal of Zoology, 44: 31-41.
- Mashaly M. M., Hendricks G. L., Kalama M. A., Gehad A. E., Abbas A. O. and Patterson P. H. 2004. Effect of heat stress on production parameters and immune responses of commercial laying hens. Poultry Science, 83: 889-894.

- Naseem M. T., Shamoon Naseem M., Younus, Zafar Iqbal Ch., Aamir Ghafoor, Asim Aslamand and Akhter S. 2005. Effect of potassium chloride and sodium bicarbonate supplementation on thermotolerance of broilers exposed to heat stress. International Journal of Poultry Science, 4: 891-895.
- NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry, 9th rev. edn, p. 27 (Washington, DC, National Research Council, National Academy Press).
- Post J., Rebel J. M. J. and ter Huurne A. A. H. M. 2003. Automated blood cell count: A sensitive and reliable method to study corticosterone-related stress in broilers. Poultry Science, 82: 591–595.
- Reece W. O., Sell J. L., Trample D. W. and Christensen W. F. 2000. Effect of dietary potassium supplementation for growing turkeys on leg weakness, plasma potassium concentration and selected blood variables. Poultry Science, 79: 1120-1126.
- Regnier J. A. and Kelley K. W. 1981. Heat and cold stress suppresses *in vivo* and *in vitro* cellular immune responses of chickens. American Journal of Veterinary Research, 42: 294.
- Regnier J. A., Kelley K. W. and Gaskins C. T. 1980. Acute thermal stressors and synthesis of antibodies in chickens. Poultry Science, 59: 985.
- SAS Institute. 2004. SAS user's Guide. Statistics. ed. Version 9. 2. SAS Institute Inc., Cary, NC.
- Silva A. V. F. and Flemming J. S. 1991. Effect of environmental temperature of acid – base balance in poultry and response to supplementation with sodium bicarbonate, ammonium chloride and stacidem. Revista de setor de Ciencias Agrarias, 11: 1/2, 23 – 30.
- Smith M. O. and Teeter R. G. 1987. Effect of ammonium chloride and potassium chloride on survival of broiler chicks during acute heat stress. Nutrition Research, 7: 677–681.
- Smith M. O. and Teeter R. G. 1987. Potassium balance of the 5 to 8 week old broiler exposed to constant heat or cycling high temperature stress and the effects of supplemental potassium chloride on body weight gain and feed efficiency. Poultry Science, 66: 487–492.
- Smith M. O. and Teeter R. G. 1988. High ambient temperature stress on acid – base balance and potassium requirements of broilers. Poultry Science, 65 (Suppl.1): 194.
- Subbarao D. S. and Glick B. 1973. Immuno - supprcssive action of heat in chicken. Proc. Soc. Experimental Biology and Medicine, 133: 445.
- Teeter R. G. and Smith M. O. 1986. High chronic ambient temperature stress effects on broiler acid-base balance on their response to supplemental ammonium chloride, potassium chloride and potassium carbonate. Poultry Science, 65: 1777–1781.
- Teeter R. G., Smith M. O., Owens F. N., Arp S. C., Sangiah S. and Breazile J. E. 1985. Chronic heat stress and respiratory alkalosis: Occurrence and treatment in broiler chicks. Poultry Science, 64: 1060 – 1064.
- Van der zijpp A. J. and Leenstra F. R. 1980. Genetic analysis of the humoral immune response of White Leghorn chicks. Poultry Science, 59: 1363-1369.
- Vecerek V., Strakova E., Suchy P. and Voslarova E. 2002. Influence high environmental temperature on production and haematological and biochemical indexes in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 47: 176-182.
- Whiting T. S., Andrews L. D. and Stamps L. 1991. Effects of sodium bicarbonate and potassium chloride drinking water supplementation. 1. performance and exterior carcass quality of broilers grown under thermoneutral or cyclic heat – stress conditions. Poultry Science, 70: 53–59.
- Zulkifli L., Dunnington E. A., Gross W. B and Siegel P. B. 1994. Inhibition of adrenal steroidogenesis, food restriction and acclimation to high ambient temperatures in chickens. British Poultry Science, 35: 417-426.

Effect of different levels of industrial potassium chloride and ammonium chloride in diets on some blood and immunological parameters of broilers under heat stress conditions

J. Salary¹, M. Yeganeparast^{2*}, F. Sahebi Ala³, M. Kalantar Nistanaki⁴

1. Graduated MSc student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
2. Graduated MSc student, Department of Animal Science, University of Tehran and Scientific Board Member of Agricultural and Natural Resources Research Center of Qom Province, Iran
3. Ph.D student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4. Ph.D student, Department of Animal Science, Shahrood University and Scientific Board Member of Agricultural and Natural Resources Research Center of Qom Province, Iran

(Received: 24-8-2013- Accepted: 24-2-2014)

Abstract

A study was conducted to investigate the effect of industrial potassium chloride (NH_4Cl) and ammonium chloride (KCl) inclusion in grower male broiler chicken diets (22 to 42 d) under heat stress of summer (23 to 41°C) in Qom province. Experiment was performed as completely randomized design with 10 treatments and 4 replicates of 8 chickens in each. Chickens were raised in controlled condition during 21 days and transferred to experimental cages. Treatments were consisted of control without supplementation or the levels of 0.6 (KCl_{0.6}), 0.7 (KCl_{0.7}), 0.8 (KCl_{0.8}) and 0.9 (KCl_{0.9}) from industrial KCl and 0.3 (NH₄Cl_{0.3}), 0.4 (NH₄Cl_{0.4}), 0.5 (NH₄Cl_{0.5}), 0.6 (NH₄Cl_{0.6}) and 0.7 (NH₄Cl_{0.7}) from industrial NH₄Cl. The results showed that weight gain of treatments KCl_{0.9} (1330.8 g) and NH₄Cl_{0.7} (1306.6 g) was greater than control (1187 g) ($P < 0.05$). Feed conversion ratio of treatment NH₄Cl_{0.6} (1.57) was lower than control (1.78) ($P < 0.05$). Hemoglobin of control (10.19 g/dl) was lower than treatments KCl_{0.8} (11.46 g/dl), KCl_{0.9} (11.83 g/dl) and NH₄Cl_{0.7} (11.36 g/dl) ($P < 0.05$). The greatest hematocrit percentage was observed in treatments KCl_{0.6} (34.19), KCl_{0.8} (34.95) and KCl_{0.9} (34.19) ($P < 0.05$). Antibody titer against Newcastle disease in KCl_{0.9} (2.35) was greater than control (1.37) ($P < 0.05$). The results showed that the addition of electrolytes in diets resulted in reduce negative effects of heat stress and amounts of 0.8 and 0.9 % KCl lead to best results.

Key words: Heat stress, Broiler, Ammonium chloride, potassium chloride

*Corresponding author: Myp1349@yahoo.com