

اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه‌های گوشتی

مجید همدیه^۱، سید عبدالله حسینی^{۲*}، هوشنج لطفالهیان^۳، مازیار محیطی اصلی^۳، علی غلامی کرکانی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه آزاد ورامین

۲- استادیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

۳- استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

۴- کارشناس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱/۱۷ - تاریخ پذیرش: ۹۲/۵/۲۷)

چکیده

به منظور بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد و ماندگاری گوشت در جوجه‌های گوشتی، آزمایشی با ۵۰۰ قطعه جوجه یک روزه، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (شاهد، جیره پایه ۱۰۰+ میلی‌گرم در کیلوگرم پروپویوتیک، جیره پایه ۱۵۰+ میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک آویلامایسین، جیره پایه ۲۰۰+ و ۴۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس آویشن شیرازی)، چهار تکرار و ۲۵ قطعه جوجه در هر تکرار به مدت ۴۲ روز انجام شد. آنالیز اسانس نشان داد که ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی شامل تیمول (۲۲/۳ درصد)، p-سیمین (۱۴/۲ درصد)، لینالول (۶/۲ درصد)، ۷-ترپین (۶/۴ درصد)، ۱۱-سینثول (۵/۳ درصد) و کارواکرول (۳/۱ درصد) هستند. افزودن اسانس آویشن شیرازی به جیره اثر معنی‌داری بر صفات عملکردی جوجه‌های گوشتی شامل وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل، ماندگاری و شاخص تولید نداشت ($P > 0.05$). خوراک مصرفی تا ۴۲ روزگی و وزن جوجه‌ها تا ۲۸ روزگی در تیمار آنتی‌بیوتیک بیشتر از سایر تیمارها بود ($P < 0.05$). میزان مواد لاشه و اجزای مختلف لاشه و چربی حفره بطنی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$). میزان مواد واکنش‌دهنده با اسید تیوباریتوريک (TBARS) در گوشت ران نگهداری شده به مدت ۹۰ روز پس از کشتار در تیمار اسانس آویشن شیرازی نسبت به تیمار آنتی‌بیوتیک کمتر بود ($P < 0.05$) اما تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشت. نتایج نشان دادند که اسانس آویشن شیرازی در بهبود عملکرد به اندازه آنتی‌بیوتیک موثر نبود اما ترکیبات آنتی‌اکسیدانی آن اثر مطلوبی بر پایداری اکسیداتیو گوشت در بلند مدت داشت و این امر می‌تواند برای نگهداری گوشت در سردخانه‌ها و ذخیره‌سازی آن، مورد توجه قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: اسانس آویشن شیرازی، جوجه‌های گوشتی، خصوصیات لاشه، عملکرد، ماندگاری گوشت

افزایش مدت زمان نگهداری گوشت و فرآورده‌های گوشتی، از مواد ضد میکروبی و آنتی اکسیدان که اکثر اوقات سنتزی هستند، استفاده می‌شود. این در حالی است که امروزه مصرف کنندگان آگاهی بیشتری در مورد عوارض استفاده از نگهدارنده‌های شیمیایی پیدا کرده‌اند و تقاضای بیشتری برای غذاهای طبیعی‌تر وجود دارد (نوری و همکاران، ۱۳۹۱). با توجه به اینکه اسانس آویشن شیرازی دارای ترکیبات فعالی است که این ترکیبات خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی دارند، این ترکیبات می‌توانند عملکرد و ماندگاری گوشت را بهبود دهند. گیاه آویشن شیرازی با نام علمی *Zataria multiflora* Boiss از خانواده نعناعیان است. گیاهی بوته‌ای و دارای ساقه‌های متعدد، نازک، سخت و بسیار منشعب به ارتفاع ۴۰ تا ۸۰ سانتی‌متر، گردینه‌پوش، سبز متمایل به سفید و معطر است. برگ آن کوتاه دارای دمبرگ کوتاه، مدور یا بیضی شکل با طول و عرض پنج تا هفت میلی‌متر، در قاعده مقطع تا تقریباً قلبی شکل و در انتهای مدور و نوکچه‌دار است. گلهای آن سفید و کوچک گوچه‌ای، بسیار متراکم و واقع در گل آذین‌های باریک تسبیح مانند، ساده و برآکته‌های پهن دراز است (قهرمان، ۱۳۶۷). یادگار و همکاران (۱۳۸۸) گزارش کردند که عصاره الکلی برگ‌ها، گل و ریشه آویشن شیرازی قادر به مهار و کشتن هر سه سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به پنی‌سیلین و *MRSA400* و استافیلوکوکوس اورئوس 25923 ATCC و سویه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس بودند. آنالیز کروماتوگرام‌ها در روش کروماتوگرافی لایه نازک نشان داد که تیمول و کاراکرول جز ترکیبات اصلی گیاه آویشن شیرازی هستند (رهنما و همکاران، ۱۳۸۸). گزارش شده است که پرندگانی که در سن ۲۱ روزگی سطوح ۰/۲ و ۰/۱۶ درصد عصاره الکلی آویشن باگی را مصرف کرده بودند در مقایسه با تیمار شاهد و آنهایی که سطح ۰/۴ درصد را مصرف کرده بودند، بیشترین تیتر آنتی‌بادی علیه ویروس برونشیت را نشان دادند (Abdulkarimi, 2011). مصحفي و همکاران (۱۳۸۵) اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه آویشن شیرازی را در شرایط برون تنی بررسی نمودند و گزارش کردند که اسانس و عصاره متابولی گیاه هر دو دارای اثر ضد باکتری و آنتی اکسیدانی هستند و می‌توانند به عنوان محافظ در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار بگیرند. این تحقیق با هدف

مقدمه

پس از منع مصرف آنتی‌بیوتیک‌های محرك رشد توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶، در سال‌های اخیر توجه بسیاری به سمت افزودنی‌های خوراکی با منشا گیاهی معطوف شده است. واژه فیتوژنیک^۱ که به مواد گیاهی و فیتوبیوتیک‌ها نیز مربوط می‌شود بیانگر ترکیبات استخراج شده از گیاهان هستند که جهت ایجاد تغییراتی در خواص خوراک و بهبود عملکرد به جیره حیوانات اضافه می‌شوند. فیتوژنیک‌ها طیف گسترده‌ای از مواد گیاهی را شامل می‌شوند که بسیاری از آنها سابقه طولانی در تغذیه انسانی دارند و به عنوان چاشنی، نگهدارنده و دارو از زمان‌های قدیم استفاده می‌شوند. این مواد گیاهی معمولاً از انواع مختلفی از ترکیبات فعال (مانند ایوجینول، سینامالدئید، کارواکرول یا تیمول) تشکیل شده‌اند که در کنار یکدیگر سبب ایجاد طعم و عطر خاص می‌شوند. در واقع، ترکیبات با منشا گیاهی عموماً به خاطر خواص طعم‌دهنده‌گی معروفند. بنابراین بر خوشخوراکی جیره‌های دام و طیور مژوژند. از طرف دیگر، به علت دارا بودن فعالیت زیستی، توانایی ایجاد اثرات مثبتی را بر سلامت دستگاه گوارش و عملکرد دارند. خواص ضد میکروبی، ضد ویروسی، ضد فقارچی، آنتی اکسیدانی و سایر فعالیت‌های ترکیبات گیاهی در شرایط برون‌تنی به خوبی مشخص شده و در آزمایشات علمی متعدد به تایید رسیده است. تعداد مطالعاتی که اثرات ترکیبات گیاهی را در شرایط برون‌تنی بر دستگاه گوارش نشان داده‌اند مانند آزمایشات تغذیه‌ای روی حیوانات نیز در حال افزایش است. میکروفلور دستگاه گوارش، مورفولوژی روده، تخلیه معده، فعالیت اندام‌های گوارشی و در نهایت فراسنجه‌های عملکردی انتظار می‌رود که تحت تاثیر ترکیبات گیاهی قرار گیرند (محیطی اصلی و همکاران، ۱۳۸۹). از طرف دیگر، گوشت و فرآورده‌های گوشتی ممکن است به آسانی به میکروارگانیسم‌های مختلف آلوده شوند و اگر شرایط حمل و نقل و نگهداری آنها مناسب نباشد، منجر به رشد باکتریهای مولد فساد و بیماری‌زا می‌شود و در نهایت کیفیت گوشت کاهش یافته و بهداشت عمومی در معرض خطر قرار می‌گیرد. نگهداری در سرداخانه، متداول‌ترین روش نگهداری گوشت و فرآورده‌های گوشتی محسوب می‌شود. در برخی از کشورها به منظور

از تیوباربیتوريک اسید استوار است. مالون دی آلدئید محصول اصلی تجزیه هیدروپراکسیدهای چربی است. در این آزمایش TBARS به عنوان محصول ثانویه اکسیداسیون، توسط روش اسید تیوباربیتوريک که به وسیله Strange *et al.* (1977) شرح داده شده است، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel مرتب و با استفاده از رویه GLM نرم افزار آماری SAS (SAS, 2002) تجزیه و تحلیل آماری شدند و مقایسه میانگین ها به روش دان肯 انجام شد.

نتایج و بحث

ترکیبات فعال زیستی اسانس آویشن شیرازی در آنالیز انجام شده تعداد ۴۰ ترکیب فعال زیستی شامل مواد فنلی، اتری، الکلی، ترپنی در اسانس آویشن شیرازی مشخص شدند که ۹۵/۱ درصد از اسانس آویشن می شدند (جدول ۲). عمدترين ترکیبات اسانس آویشن شیرازی شامل ۲۲/۳ درصد تیمول، ۱۴/۲ درصد *p*-سیمین، ۶/۴ درصد ۷-ترپینن، ۵/۳ درصد ۱۰-سینئول، ۶/۲ درصد لینالول و ۳/۱ درصد کارواکرول بود. تمامی این ترکیبات فعال موجود در اسانس گیاه آویشن شیرازی خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال دارند و در مورد فعالیتهای زیستی این مولکول های گیاهی و خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آنها مستندات خوبی به دست آمده است (محیطی اصلی و همکاران، ۱۳۸۹). ترکیبات اسانس گیاه آویشن شیرازی حاوی ۳۷/۴ درصد تیمول، ۳۳/۶ درصد کارواکرول، ۷/۷ درصد *p*-سیمین، ۳/۹ درصد ۷-ترپینن، ۲/۱ درصد بتا کاربوفیلن گزارش شده است (مصطفی و همکاران، ۱۳۸۵). در تحقیق دیگری ترکیبات اصلی آویشن شیرازی ۴۴/۶ درصد تیمول، ۲۱/۵ درصد ۷-ترپینن و ۱۳/۷ درصد *p*-سیمین گزارش شد (Ebrahimzadeh *et al.*, 2003) اسانس آویشن شیرازی و مقدار آن در اکوتیپ های مختلف این گیاه ۲۷/۱ تا ۶۴/۹ درصد گزارش شده است (Saei-Dehkordi *et al.*, 2010).

عملکرد جوجه های گوشتی

نتایج مربوط به خوراک مصرفی در جدول ۳ ارائه شده است. خوراک مصرفی در سن ۱۴ و ۲۸ روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$). خوراک مصرفی

بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی در مقایسه با آنتی بیوتیک و پر بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه های گوشتی انجام شد.

مواد و روش ها

آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد ۵۰۰ قطعه جوجه گوشتی آرین، با پنج تیمار شامل گروه شاهد (جیره پایه)، جیره پایه + ۱۰۰ میلی گرم در کیلوگرم پر بیوتیک پروتکسین (شاهد مثبت)، جیره پایه + ۱۵۰ میلی گرم آنتی بیوتیک آولامایسین در کیلوگرم (شاهد مثبت)، جیره پایه + ۲۰۰ میلی گرم اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در کیلوگرم، جیره پایه + ۴۰۰ میلی گرم اسانس آویشن شیرازی در کیلوگرم، با چهار تکرار و ۲۵ قطعه جوجه در هر تکرار به مدت ۴۲ روز در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور واقع در حیدر آباد کرج انجام شد. اسانس مورد استفاده از یکی از شرکتهای تولید کننده اسانس تهیه شد و توسط گروه فیتوشیمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی (GC-MS) آنالیز شد.

در طول مدت پرورش از سه جیره غذایی استفاده شد (جدول ۱). احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی در دوره های مختلف آزمایش شامل آغازین (۱-۱۴ روزگی)، رشد (۱۵-۲۸ روزگی) و پایانی (۲۹-۴۲ روزگی) از جداول راهنمای پرورش جوجه های گوشتی آرین و ترکیب شیمیایی اقلام خوراکی مورد استفاده در جیره آزمایشی از جداول استاندارد غذایی (NRC, 1994) استخراج شدند.

صرف خوراک، ضریب تبدیل و میانگین وزن بدن به صورت هفتگی و شاخص تولید و درصد ماندگاری و تفکیک لاشه شامل درصد لاشه، ران، سینه، پشت کمر به همراه گردن و بال و درصد چربی حفره بطني در ۴۲ روزگی اندازه گیری شد. جهت تعیین خصوصیات کیفی گوشت ران و سینه در دو زمان مختلف (۴۵ و ۹۰ روز) از نمونه های نگهداری شده در فریزر (۲۰°C) استفاده شد. برای اندازه گیری پراکسیداسیون چربی های گوشت، مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوريک (Thiobarbituric Acid Reactive Substance; TBARS) (Acid Reactive Substance; TBARS) حاصل از واکنش یک مولکول مالون دی آلدئید با دو مولکول

جدول ۱- ترکیب مواد تشکیل دهنده جیره‌های آزمایشی

Table 1. Ingredients and composition of experimental diets

Ingredient (%)	Age(day)		
	0-14	15-28	29-42
Corn	48.6	45.7	45.55
Wheat	6.78	15	20
Soybean meal	36.5	32	27.9
Fish meal	2.1	1.4	0.5
Soybean oil	1.6	2.1	2.0
Sodium bicarbonate	0.2	0.15	0.15
Di-calcium phosphate	1.9	1.68	1.8
Oyster Shell	1.25	1.05	1.1
Common salt	0.25	0.25	0.25
DL-Methionine	0.27	0.17	0.18
L-Lysine HCl	0.05	-	0.07
Vitamin - mineral premix	0.5	0.5	0.5
Chemical composition of diets			
ME (kcal/kg)	2851	2937	2965
Crude protein (%)	22.2	20.4	18.5
Threonine (%)	0.85	0.77	0.69
Methionine + cystine (%)	0.99	0.83	0.78
Lysine (%)	1.28	1.10	1.0
Available phosphorus (%)	0.5	0.45	0.45
Calcium (%)	1.06	0.9	0.9
Sodium (%)	0.18	0.16	0.91
Cation Anion Balance	258	234	0.16

Vitamin Premix provided the following amounts per kilogram of diet: Vitamin A, 9000 IU. Vitamin B₁, 1.8 mg. Vitamin B₂, 6.6 mg. Niacin, 30 mg. Calcium pantothenate, 10 mg. Vitamin B₆, 3 mg. Folic acid 1 mg. Vitamin B₁₂, 0.015 mg. Biotin 0.1 mg. Vitamin D₃, 2000 IU. Vitamin E, 18 IU. Vitamin K₃, 2 mg. Choline chloride 500 mg. Mineral supplement provided the following amounts per kilogram of diet: Mn (manganese oxide), 100 mg. Iron (ferrous sulfate, FeSO₄), 50 mg. Zinc (zinc oxide), 100 mg. Copper (copper sulphate, CuSO₄), 10 mg. Iodine (calcium iodate), 1 mg. Selenium (sodium selenite), 0.2 mg.

جدول ۲- ترکیب اسانس آویشن شیرازی مورد استفاده در این تحقیق

Table 2. Composition of thyme (*Zataria multiflora* Boiss) essential oils used in this study

Compound	Percentage	Compound	Percentage
Tricyclene	0.36	1-Borneol	1.14
α-Pinene	1.81	4-Terpineol	1.24
Camphene	3.15	α-Terpineol	1.17
Sabinene	0.04	γ-Terpineol	0.39
β-Pinene	3.29	cis-Geraniol	0.2
β-Myrcene	1.84	Cumin aldehyde	0.25
δ-3-Carene	0.68	Linalyl acetate	0.68
α-Terpinene	2.96	trans-Geraniol	0.42
m-Cymene	0.38	trans-Ascaridol glycol	0.12
p-Cymene	14.2	Thymol	22.31
Limonene	1.55	Carvacrol	3.1
1,8-Cineol	5.3	Neryl acetate	0.6
E-β-Ocimene	0.12	α-Copaene	0.15
γ-Terpinene	6.41	trans Caryophyllene	2.97
trans-Linalool oxide	0.23	α-Humulene	0.3
α-Terpinolene	0.91	Caryophyllene oxide	0.91
Linalool	6.2	Myristic acid	0.31
trans-β-Terpineol	0.21	Hexadecanal	0.22
Borneol	0.74	Pentadecanoic acid	0.55
Hexadecanamide	0.53	Palmitic acid	7.15

جدول ۳- اثر آویشن شیرازی بر خوراک مصرفی، وزن بدن، درصد ماندگاری و شاخص تولید

Table 3. Effect of thyme (*Zataria multiflora* Boiss) essential oil on feed intake, body weight, feed conversion ratio, percent of livability and production index

Studied traits	Treatment						SEM	P-value
	Control	Antibiotic	Probiotic	Thyme (200)	Thyme (400)			
Feed intake(g)	1-14d	455.1	465.4	469.2	447.3	458.3	4.16	0.292
	1-28d	1565.9	1689.2	1736.8	1527.6	1576.7	29.50	0.094
	1-42d	3390.4 ^b	3778.3 ^a	3716.6 ^{ab}	3342.9 ^b	3332.5 ^b	65.94	0.037
Body weight (g)	14d	304.7 ^b	335.6 ^a	327.6 ^{ab}	301.4 ^b	309.8 ^{ab}	4.63	0.050
	28d	915.9 ^b	1017.5 ^a	961.2 ^{ab}	900.3 ^b	887.5 ^b	14.69	0.008
	42d	1880.6	2058.6	1964.1	1905.0	1883.0	26.04	0.134
Feed conversion ratio (g/g)	1-14d	1.46	1.38	1.43	1.48	1.48	0.013	0.071
	1-28d	1.71	1.66	1.81	1.69	1.77	0.026	0.403
	1-42d	1.80	1.84	1.89	1.76	1.77	0.026	0.540
Production index		226.3	246.7	237.4	247.3	236.7	4.95	0.744
Livability (%)		91.1	92.4	95.9	95.5	92.7	0.906	0.417

Means with different superscripts in the same row differ significantly ($P<0.05$)

الکلی آویشن باعی روی عملکرد رشد و صفات لاشه نشان داده شد که بیشترین مصرف خوراک بین تیمارها در طول دوره رشد و کل دوره آزمایش مربوط به جوجه‌هایی بود که Abdulkarimi *et al.*, (2011) سطح ۲ درصد را دریافت کردند (۰.۱۴). نتایج مربوط به وزن بدن در جدول ۳ ارایه شده است. طبق نتایج، وزن بدن در سن ۱۴ و ۲۸ روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ($P<0.05$) و بالاترین وزن بدن در تیمار آنتی‌بیوتیک بود. وزن بدن در سن ۴۲ روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P>0.05$). گزارش شده است که عصاره آویشن کوهی سبب بهبود افزایش وزن شد (باقری شیره جینی و همکاران، ۱۳۸۹a). گزارش شده است که اثر گیاهان دارویی (زرد چوبه، آویشن باعی و دارچین) بر وزن بدن در صفر تا ۴۲ روزگی معنی‌دار نبود که با نتایج ما مطابقت ندارد. در مطالعه دیگری انسانس آویشن باعی مصرف خوراک را به طور معنی‌داری کاهش داد (Sengul *et al.*, 2008) که این مسئله ممکن است به علت مزه تلخ ترکیبات فنولیک در انسانس آویشن باعی باشد (محمد امینی، ۱۳۹۰). در مطالعه‌ای افزودن ۰/۲ درصد اندوژنوس عملکرد طیور را بهبود می‌دهند (Cross *et al.*, 2007). همچنین جوجه‌هایی که عصاره الکلی آویشن باعی در آب آشامیدنی دریافت کردند بیشترین افزایش وزن را داشتند که ممکن است مربوط به خواص ضد میکروبی و محرك هضمی میکروبی و تحریک ترشح آنزیمهای هضمی (Abdulkarimi *et al.*, 2011). بعضی دیگر از محققان با استفاده از آویشن باعی در تغذیه جوجه‌های گوشتی تفاوتی در عملکرد را در مقایسه با گروه شاهد یا آنتی‌بیوتیک مشاهده نکردند (Mohammad Amini, 2011; Sengul *et al.*, 2008; Demir *et al.*, 2008).

علت عدم اثرگذاری گروههای آزمایشی تا سن ۴۲ روزگی متفاوت بود، به طوریکه بالاترین خوراک مصرفی در تیمار آنتی‌بیوتیک و کمترین در تیمار گیاهان دارویی و گروه شاهد مشاهده شد ($P<0.05$). گزارش شده است که کاراکرول در سطح ۲۰۰ ppm به طور معنی‌داری خوراک مصرفی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد (Lee *et al.*, 2003). احتمالاً کاراکرول مصرف خوراک را با تعديل اشتباها تحت تاثیر قرار می‌دهد. باقری شیره‌جینی و همکاران (۱۳۸۹a) گزارش کردند که عصاره آویشن کوهی سبب کاهش مصرف خوراک شد که با نتایج ما مطابقت دارد. محمد امینی (۱۳۹۰) گزارش کردند اثر گیاهان دارویی (زرد چوبه، آویشن باعی و دارچین) بر مصرف خوراک در صفر تا ۴۲ روزگی معنی‌دار نبود که با نتایج ما مطابقت ندارد. در مطالعه دیگری انسانس آویشن باعی مصرف خوراک را به طور معنی‌داری کاهش داد (Sengul *et al.*, 2008) که این مسئله ممکن است به علت مزه تلخ ترکیبات فنولیک در انسانس آویشن باعی باشد (محمد امینی، ۱۳۹۰). در مطالعه‌ای افزودن ۰/۲ درصد پودر خشک شده آویشن باعی به جیره جوجه‌های گوشتی سویه راس ۳۰۸ تفاوت معنی‌داری در خوراک مصرفی ایجاد نکرد (Ocak *et al.*, 2008). گزارش شده است که مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی تعذیه شده با جیره جوجه‌های حاوی گیاهان دارویی آویشن، دارچین و میخک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (Najafi and Torki, 2010). همچنین در جوجه‌های گوشتی تعذیه شده با جیره حاوی آویشن باعی مصرف خوراک تحت تاثیر قرار نگرفت (Toghyani *et al.*, 2010). در بررسی اثر مکمل عصاره

بهبود بخشید. احتمالاً کارواکرول مصرف خوراک را با تعديل اشتها تحت تأثیر قرار می‌دهد و مکمل سازی با ۱۰۰ میلی‌گرم تیمول در کیلوگرم ترشح آنزیم‌های پانکراس را تحريك می‌کند، در نتیجه ضریب تبدیل بهبود می‌یابد (Lee *et al.*, 2003). محققین بهبود ضریب تبدیل را هنگام استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها اینگونه تفسیر کردند که آنتی‌بیوتیک‌ها با محدود کردن رشد شماری از باکتری‌ها و تولید سموم و محصولات فرعی آنها (عمدتاً باکتری‌های گرم مثبت) در روده، رقابت باکتری‌ها برای مواد غذی را با میزان کاهش می‌دهند و میزان جذب و استفاده از مواد غذایی را با نازک‌کردن دیواره روده افزایش می‌دهند (Waibel *et al.*, 1991). اثر کارواکرول بر ضریب تبدیل غذایی می‌تواند به افزایش بازده خوراک و یا تغییر ترکیب لاشه مربوط باشد. کارواکرول باعث رشد و تحريك لاکتوباسیلوس‌ها می‌شود، این باکتریها نقش مهمی در بهبود عملکرد پرنده دارند (Tschirch, 2000). اثرات سودمند ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی گیاهان دارویی در رابطه با حفاظت از پرזהای روده از طریق فعالیت آنتی‌اکسیدانی بین سلولی صورت می‌گیرد. در نتیجه اثر آنتی‌اکسیدانی در سلول‌های پز روده جذب مواد غذی بهبود می‌یابد (Manzanillo *et al.*, 2001).

مطابق جدول ۳، ماندگاری و شاخص تولید در سن ۴۲ روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند ($P > 0.05$). محمد امینی و همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند اثر گیاهان دارویی (زرد چوبه، آویشن باغی و دارچین) بر شاخص تولید و ماندگاری معنی‌دار نبود که با Ocak *et al.*, 2008) استفاده از ۰/۲ درصد آویشن باغی، میزان تلفات را در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری کاهش داد که با نتایج ما مطابقت دارد. ولی از نظر عددی اسانس آویشن در سطح ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم بالاترین ماندگاری را بعد از پروپیوتیک داشت. همچنین، اثر سه عصاره گیاهی (آویشن باغی، سرخارگل و سیر) بر عملکرد، سیستم ایمنی، فاکتورهای خونی و فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد که میزان تلفات تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت اما میزان مرگ و میر در تیمار عصاره آبی آویشن باغی صفر بود (Rahimi *et al.*, 2011). در تحقیق حاضر نیز اسانس

آویشن بر عملکرد جوجه‌های گوشتی ممکن است به ترکیبات اسانس استفاده شده و جیره آزمایشی مربوط باشد. در جیره‌های دارای مواد خوراکی با قابلیت هضم بالا، میکروفلورای روده به دلیل عدم دسترسی به سوبسترای مورد نیاز کاهش می‌یابند و لذا اثرات ضد میکروبی عصاره‌های گیاهی کمتر مشاهده می‌شود (Lee *et al.*, 2003). اغلب آزمایشات انجام شده روی آویشن باغی (Thymus vulgaris) انجام گرفته است اما در ایران گونه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بیشترین پراکنش را دارد. ترکیبات اسانس این گیاه با آویشن باغی متفاوت است و میزان تیمول و کارواکرول آن در آنالیز انجام شده در این تحقیق بسیار کمتر از آویشن باغی است. بنابراین یکی دیگر از دلایل عدم تاثیرگذاری اسانس آویشن شیرازی در آزمایش حاضر بر عملکرد رشد جوجه‌ها ممکن است این مساله باشد. طبق نتایج جدول ۳، ضریب تبدیل در سنین ۱۴ و ۲۸ و ۴۲ روزگی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$). باقی شیره جینی و همکاران (۱۳۸۹a) گزارش کردند که عصاره آویشن کوهی سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی شد که با نتایج ما مطابقت دارد. محمد امینی و همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند اثر گیاهان دارویی (زرد چوبه، آویشن باغی و دارچین) بر ضریب تبدیل معنی‌دار نبود که با نتایج ما در ۴۲ و ۰/۲ روزگی مطابقت دارد. گزارش شده است که افزودن ۰/۲ درصد پودر خشک شده آویشن باغی به جیره جوجه‌های گوشتی سویه راس ۳۰۸ تفاوت معنی‌داری در ضریب تبدیل، ایجاد نکرد (Ocak *et al.*, 2008). نشان داده شده است که اسانس آویشن باغی بر ضریب تبدیل بلدرچین اثر معنی‌داری نداشت (Sengul *et al.*, 2008). عملکرد، متابولیت‌های خون و ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی اسانس‌های گیاهان دارویی (آویشن، دارچین و میخک) بررسی شد و ضریب تبدیل به جز برای ضریب تبدیل در ۲۲-۴۲ روزگی، تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (Najafi and Torki, 2010). جوجه‌هایی که با جیره حاوی آویشن تغذیه شدند ضریب تبدیل آنها نسبت به سایر تیمارها در طول دوره رشد بهبود پیدا کرده بود که با نتایج ما در ۴۲ روزگی مطابقت دارد. گزارش شده است که کارواکرول (از ترکیب‌های مهم اسانس آویشن) در سطح ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خوراک مصرفی، وزن بدن را کاهش داد و ضریب تبدیل را

جدول ۴- اثر آویشن شیرازی بر وزن نسبی لاشه و اجزای مختلف لاشه در پایان دوره

Table 4. Effect of thyme (*Zataria multiflora Boiss*) on the relative weight of carcass and various components of carcasses at the end of period

Treatment	Carcass (%)	Breast (%)	Thigh (%)	Back with neck and wings (%)	Abdominal fat (%)
Control	68.71	18.52	18.73	19.54	1.19
Antibiotic	72.00	19.51	19.04	21.04	1.68
Probiotic	71.24	19.26	19.43	21.50	1.59
Thyme (200)	70.61	19.22	19.24	20.81	1.39
Thyme (400)	70.72	18.92	19.02	19.94	1.41
SEM	0.457	0.281	0.265	0.282	0.085
P-value	0.22	0.89	0.96	0.19	0.447

Means with different superscripts in the same column differ significantly ($P<0.05$)

جدول ۵- اثر آویشن شیرازی بر میزان TBARS گوشت ران و سینه

Table 5. Effect of thyme (*Zataria multiflora Boiss*) on TBARS in the thigh and breast meat

Treatment	Thigh		Breast	
	TBARS(µg/g)	TBARS(µg/g)	TBARS(µg/g)	TBARS(µg/g)
45 days after slaughtering	0.330	0.343 ^b	0.306	0.544
90 days after slaughtering		1.069 ^a	0.312	0.938
Control		0.866 ^{ab}	0.310	1.018
Antibiotic	0.494		0.215	0.552
Probiotic	0.395		0.538	1.063
Thyme (200)	0.129	0.293 ^b		
Thyme (400)	0.260	0.789 ^{ab}		
SEM	0.045	0.104	0.046	0.084
P-value	0.125	0.039	0.275	0.079

Means with different superscripts in the same column differ significantly ($P<0.05$)

همکاران (۱۳۹۰) گزارش کردند که اثر زرد چوبه، آویشن باغی و دارچین بر بازده لاشه، وزن نسبی سینه و ران و چربی محوطه بطنی معنی دار نبود. گزارش شده است که با افزودن مواد موثره تیمول، کارواکرول، سینامالدئید به جیره جوجه‌های گوشتی نسبت ماهیچه سینه بهبود یافت (Jamroz *et al.*, 2003). این بهبود می‌تواند به علت بهتر شدن قابلیت هضم آمینواسیدها باشد (Tschirch, 2000). گزارش شد که افزودن ۰/۲ درصد پودر خشک شده برگ آویشن به جیره جوجه‌های گوشتی سویه راس، ۳۰۸ تفاوت معنی داری در وزن لاشه، بازده لاشه و وزن نسبی اندام‌های گوارشی ایجاد نکرد (Ocak *et al.*, 2008). نتایج مطالعه‌ای نشان داد که جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم انسانس آویشن باغی و دارچین به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل چربی بطنی کمتر داشتند (Al-Kassie and Jameel, 2009). محققین گزارش کردند که تاثیر گذاشتن بر میزان توده ماهیچه‌ای پرندگان از طریق تغذیه بسیار مشکل است (Tessaraud *et al.*, 1999). وزن نسبی سینه، ران و چربی حفره بطنی در جوجه‌های گوشتی تحت تاثیر انسان‌های گیاهان دارویی

آویشن شیرازی بعد از پروبیوتیک کمترین درصد تلفات را از نظر عددی داشت.

تفکیک لاشه

نتایج مربوط به وزن نسبی لاشه و اجزای مختلف لاشه در جدول ۴ ارایه شده است. طبق نتایج جدول، وزن نسبی لاشه، وزن سینه، وزن ران، وزن پشت کمر و چربی حفره بطنی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P>0.05$). محققین گزارش کردند که بالاترین درصد لاشه مربوط به تیمار کاسنی و بالاترین درصد سینه و کمترین درصد چربی حفره بطنی مربوط به تیمار آویشن است (باقری و همکاران, ۱۳۸۹). در مطالعه‌ای درصد لاشه، درصد چربی حفره بطنی و وزن اندامهای گوارشی تحت تاثیر عصاره‌های آویشن باغی، سرخارگل و سیر قرار نگرفت (تیموری‌زاده و همکاران, ۱۳۸۹). باقری شیره جینی و همکاران (۱۳۸۹a) گزارش کردند که عصاره آویشن کوهی سبب افزایش وزن نسبی سینه شد که با نتایج ما مطابقت دارد. اما باقری شیره جینی و همکاران (۱۳۸۹b) گزارش کردند که چربی حفره بطنی تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت که با نتایج ما مطابقت دارد. محمد امینی و

Hsu and Liu, 2004). حساسیت بافتها به پراکسیداسیون چربی، بستگی به بالانس آنتی اکسیدان به پروکسیدان دارد. محققین نشان دادند افزودن پودر برگ چای به جیره جوجه‌های گوشتی سبب کاهش میزان مالون دی‌آلدئید می‌شود (Yang et al., 2003). در مطالعه‌ای اسانس دارچین در سطح ۱۰۰۰ ppm، سطوح مالون دی‌آلدھید را به طور معنی‌داری در سرم خون جوجه‌های گوشتی کاهش داد و فعالیت آنزیمه‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش داد و Ciftci et al., 2010) همچنین کیفیت گوشت نیز بهبود یافت (۲۰۱۰). محمد امینی (۱۳۹۱) گزارش کرد که گیاهان دارویی زرد چوبه، آویشن باغی و دارچین اثر معنی‌داری بر میزان پراکسیداسیون لیپیدها در ۳۰ و ۶۰ روز بعد از کشتار ندارند در حالی که در ۹۰ روز بعد از کشتار، گیاهان دارویی اثر معنی‌داری بر مقدار TBARS گوشت داشتند. امروزه ذخیره‌سازی گوشت مرغ بین ۳-۴ ماه صورت می‌گیرد لذا با توجه به اثر آویشن باغی بر کاهش میزان مالون دی‌آلدئید گوشت ۹۰ روز بعد از کشتار می‌توان نتیجه گرفت که گیاهان دارویی در بلند مدت دارای اثر مطلوب بر پایداری اکسیدانتیو گوشت هستند که این امر برای نگهداری گوشت در سردخانه‌ها و ذخیره‌سازی آن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

مطابق نتایج تحقیق حاضر، ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی شامل تیمول، *p*-سیمین، ۷-تریپین، ۱و-۸-سینثول، لینالول و کارواکرول است. هر چند اسانس آویشن شیرازی اثری بر عملکرد جوجه‌های گوشتی نداشت اما استفاده از ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌گرم اسانس آویشن شیرازی در هر کیلوگرم جیره سبب کاهش خوراک مصرفی در ۴۲ روزگی و سطح ۲۰۰ میلی‌گرم اسانس آویشن شیرازی در کیلوگرم سبب کاهش میزان TBARS در گوشت ران ۹۰ روز بعد از کشتار شد.

آویشن، دارچین و میخک قرار نگرفت (Najafi and Torki, 2010). عملکرد، اینمی، سرم بیوشیمیایی و پارامترهای خونی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی پودر آویشن باغی به عنوان جایگزینی برای یک آنتی‌بیوتیک محرك رشد را مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند که درصد چربی حفره بطنی، بازده لاشه تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت (Toghani et al., 2010). اثر مکمل عصاره الکلی آویشن باغی روی عملکرد رشد و برخی صفات لاشه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد که وزن نسبی بال جوجه‌هایی که سطح چهار درصد را دریافت کردند، به طور معنی‌داری بیشتر از جوجه‌هایی بود که سطح صفر درصد را دریافت کردند. عصاره آویشن در آب آشامیدنی به طور معنی‌داری وزن نسبی سینه و بال را افزایش داد (Abdulkarimi et al., 2011). آنها نتیجه گرفتند که مصرف عصاره الکلی آویشن باغی در آب آشامیدنی، عملکرد و وزن نسبی سینه جوجه‌های گوشتی را بهبود می‌بخشد که ممکن است مربوط به خواص ضد میکروبی و محرك هضمی عصاره آویشن یا pH پایین آن باشد.

ماندگاری گوشت

نتایج مربوط به میزان مالون دی‌آلدئید تولیدی در گوشت ران و سینه در جدول ۵ ارایه شده است. میزان TBARS در گوشت سینه در ۴۵ و ۹۰ روز بعد از کشتار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$). میزان TBARS در گوشت ران در ۴۵ روز بعد از کشتار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P > 0.05$). بالاترین میزان TBARS در گوشت ران در ۹۰ روز بعد از کشتار در تیمار آنتی‌بیوتیک بود ($P < 0.05$). گروه‌هایی که اسانس آویشن شیرازی دریافت نمودند مقدار TBARS کمتری در گوشت ران نسبت به گروه شاهد ثبت آنتی‌بیوتیک داشتند، اما تقاضی با شاهد نداشتند. ترکیبات فنولیک اسانس آویشن به ویژه تیمول و کارواکرول مسئول فعالیت آنتی اکسیدانی در سیستم لیپیدی هستند (Deighton et al, 1993). نقش محافظتی گیاهان دارویی ممکن است مربوط به مکانیسم آنتی اکسیدانی از طریق القا

فهرست منابع

- باقری شیره‌جینی ز، شکوری م. د، میرزائی ف. و باقري م. ۱۳۸۹a. بررسی امکان جایگزینی عصاره آویشن کوهی (*Thymus kotschyanus*) به جای آنتی‌بیوتیک محرک رشد فلاومایسین در جیره حاوی گندم جوجه‌های گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج). ۶۱۰-۶۰۷.
- باقری شیره‌جینی ز، شکوری م. د، میرزائی ف. و باقري م. ۱۳۸۹b. تأثیر عصاره آویشن کوهی (*Thymus kotschyanus*) در جیره حاوی گندم بر فراسنجه‌های لیپیدی سرم خون و چربی حفره بطی جوجه‌های گوشتی جوان. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج). ۶۱۴-۶۱۱.
- باقری م، صفامهر ع. ر. و نوبخت ع. ۱۳۸۹. بررسی اثرات آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک و گیاهان دارویی کاسنی، پونه و آویشن بر عملکرد و صفات لشه جوجه‌های گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج). ۶۳۰-۶۲۷.
- تیموری‌زاده ز، رحیمی ش، کریمی ترشیزی م. ا و امید بیگی ر. ۱۳۸۹. مقایسه اثر عصاره‌های آویشن (*Thymus vulgaris L*)، سرخار گل (*Allium sativum L*)، سیر (*Echinacea purpurea (L) Moench*) و آنتی‌بیوتیک ویرجینومایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لشه جوجه‌های گوشتی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۲۶: ۲۶۴-۲۵۲.
- رهنما م، رضوی روحانی، س. م، تاجیک ح، خلیقی سیگارودی، ف. و رضازادباری م. ۱۳۸۸. بررسی اثرات ضد میکروبی انسان آویشن شیرازی و نایسین به تنها ی و ترکیبی با یکدیگر بر علیه لیستریا مونوسیتوژن در آبغوشت قلب- مغز. فصلنامه گیاهان دارویی، ۸: ۱۳۱-۱۲۰.
- قهارمان ا. ۱۳۶۷. فلور ایران، تهران. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراعع، ج ۱۱.
- محمد امینی م. ۱۳۹۰. بررسی و مقایسه اثر سه گیاه دارویی بر عملکرد، خصوصیات لشه و فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
- محیطی‌اصلی م، حسینی س. ع، میمندی‌پور ا. و مهدوی ع. ۱۳۸۹. گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور. انتشارات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۳۱۷ صفحه، چاپ اول.
- مصحفي م. ح، منصوری ش، شریفی فر ف. و خشنودی م. ۱۳۸۵. اثرات ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی انسان و عصاره گیاه آویشن شیرازی در برون تن. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۴: ۴۳-۳۳.
- نوری ن، دهرکنی ن، آخوند زاده بستی ا، میثاقی ع، مداغ مقدم آ، یحیی رعیت ر. و قبری سقرلو ن. ۱۳۹۱. اثر ضد میکروبی انسان آویشن شیرازی بر *E.coli O157: H7* در گوشت چرخ کرده گوساله در طی نگهداری در دمای یخچال به منظور جایگزینی با نگهدارنده‌های شیمیایی و تامین سلامت مصرف کنندگان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۰: ۱۹۷-۱۹۲.
- یادگار ع، ستاری م، بیگدلی م. و بختیاری ف. ۱۳۸۸. بررسی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ، گل و ریشه آویشن شیرازی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین. فصلنامه گیاهان دارویی، ۹: ۶۵-۵۸.
- Abdulkarimi R. 2011. Immune response of broiler chickens supplemented with Thyme extract (*thymus vulgaris*) in drinking water. Annals of Biological Research, 2: 208-212.
- Abdulkarimi R., Aghazadeh A. M. and Daneshyar M. 2011. Growth performance and some carcass characteristics in broiler chickens supplemented with thymus extract (*Thymus vulgaris*) in drinking. Journal of American Science, 7: 400-405.
- Al-kassie G. A. M. and Jameel Y. J. 2009. The effect of adding *thymus vulgaris* and cinnamomum zeylanicum on productive performance in broilers. Proceeding of 9th veterinary scientific conference, College of Veterinary Medicine, University of Baghdad, Iraq.
- Ciftci, M., Ulku G., Abdurrauf Y., Okkes Y. and Bestami D. 2010. Effects of dietary antibiotic and cinnamon oil supplementation on antioxidative enzyme activities, cholesterol levels and fatty acid composition of serum and meat in broiler chickens. Acta Veterinaria, 79: 33-40.
- Cross D. E., McDevitt R. M., Hillman K. and Acamovic T. 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science, 48: 496-506.

- Deighton N., Gidewell S. M., Deans S. G. and Goodman B. A. 1993. Identification by EPR spectrocroscopy of carvacrol and thymol as a major source of free radicals in the oxidation of plant essential oils. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 63: 221-225.
- Demir E., Kilinc K., Yildirim Y., Dincer F. and Eseceli H. 2008. comparative effects of mint, sage, thyme and flavomycin in wheat-based broiler diets. *Archiva Zootechnica*, 11: 54-63.
- Ebrahimzadeh H., Yamini Y., Sefidkon F., Chaloosi M. and Pourmortazavi S. M. 2003. Chemical composition of the essential oil and supercritical CO₂ extracts of *Zataria multiflora* Boiss. *Food Chemistry*, 83: 357-361.
- Gandomi H., Misaghi A., Akhondzadeh Basti A., Bokaei S., Khosravi A., Abbasifar A. and Jebelli Javan A. 2009. Effect of *Zataria multiflora* Boiss essential oil on growth and aflatoxin formation by *Aspergillus flavus* in culture media and cheese. *Food and Chemical Toxicology*, 47: 2397-2400.
- Hsu D. Z. and Liu M. Y. 2004 Sesame oil protects against lipopolysaccharide-stimulated oxidative stress in rats. *Critical Care Medicine*, 32: 227-231.
- Jamroz D., Orda J., Kamel C., Williczkiewicz A., Wertelecki T. and skorupin'ska J. 2003. The influence of phytogenic extract on performance, nutrients digestibility, carcass characteristic and gut microbial status in broiler chickens. *Journal of Animal and Feed Science*, 12: 583-596.
- Lee K. W., Everts H., Kappert H. J., Frehner M., Losa R. and Beynen A. C. 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. *British Poultry Science*, 44: 450-457.
- Manzanillo E. G., Baucelis F., Kamel C., Morales J., Perez J. F. and Gass J. 2001. Effects of plant extracts on the performance and lower gut microflora of early weaned piglets. *Journal of Animal Science*, 1: 473-476.
- Najafi P., and Torki M. 2010. Performance, blood metabolites and immunocompetence of broiler chicks fed diets included essential oils of medicinal herbs. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 9: 1164-1168.
- NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th Ed. Natl. Acad. Sci., Washington DC.
- Ocak N., Erener F., Burak A. K., Sungu M., Altop A. and Ozmen A. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (*Mentha piperita L.*) or thyme (*Thymus vulgaris L.*) leaves as growth promoter source. *Czech Journal of Animal Science*, 53: 169-175.
- Rahimi S., Teymouri zadeh Z., Karimi torshizi M. A., Omidbaigi R. and Rokni H. 2011. Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 13: 527-539.
- Saei-Dehkordi S. S., Tajik H., Moradi M. and Khalighi-Sigaroodi F. 2010. Chemical composition of essential oils in *Zataria multiflora* Boiss from different parts of Iran and their antioxidant and antimicrobial efficacy. *Food and Chemical Toxicology*, 48, 1562-1567.
- Sengul T., Yurtseven S., Cetin M., Kocyigit A. and Sogut B. 2008. Effect of thyme (*T. vulgaris*) extract on fattening performance, some blood parameters, oxidative stress and DNA damage in Japanese quails. *Journal of Animal and Feed Science*, 17: 608-620.
- Strange E. D. and Benedict R. C. 1977. Evaluation of rapid tests for monitoring alterations in meat quality during storage. *Journal of Food Protection*, 40: 843-847.
- Tessaraud S., Bihan-dural E., Pereson R., Michel J. and Chagueau A. M. 1999. Response of chick lines selected on carcass quality to dietary lysine supply. *Poultry Science*, 78: 80-84.
- Toghyani M., Tohidi M., Gheisari A. A. and Tabeidian S. A. 2010. Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. *African Journal of Biotechnology*, 9: 6819-6825.
- Tschirch H. 2000. The use of natural plant extracts as production enhancers in modern animal rearing practices. *Zeszyły naukowe akademici rolniczej wrocław, zootechnik*, 376: 25-39.
- Waibel P. E., Halvorson J. C., Noll L. S. and Hoffbeck S. L. 1991. Influence of Virginiamycin on growth and efficiency of large white turkeys. *Poultry Science*, 70: 837-847.
- Yang C. J., Yang I. Y., Oh D. H., Bae I. H., Cho S. G., Kong I. G., Uuganbayar D. and Choi K. S. 2003. Effect of green tea by-product on performance and body composition in broiler chicks. *Asian-Australian Journal of Animal Science*, 16: 867-872.

Effect of thyme (*Zataria multiflora Boiss*) essential oil on performance, carcass characteristics, and meat oxidative stability of broilers

M. Hamdieh¹, S. A. Hosseini^{2*}, H. Lotfollahian², M. Mohiti-Asli³, A. Gholami-Karkani⁴

1. M.Sc Student of Animal Nutrition, Azad University of Varamin

2. Assistant professor in Department of Nutrition and Physiology, Animal Science Research Institute

3. Assistant professor in Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan

4. Technician of Animal Science Research Institute

(Received: 6-4-2013- Accepted: 18-8-2013)

Abstract

To investigate the effects of *Zataria multiflora Boiss* essential oil on performance and oxidative stability of meat of broiler chicks, an experiment was conducted with 500 one-day-old chicks as completely randomized design with 5 treatments (control, basal diet with 100 mg/kg probiotic, basal diet with 150 mg/kg avilamycin, and basal diet with 200 or 400 mg/kg *Zataria multiflora Boiss* essential oil), 4 replicates and 25 chicks per replicate for 42 days. Results indicated that the main compounds of *Zataria multiflora Boiss* essential oil were thymol (22.3%), *p*-cymene (14.2%), linalool (6.2%), γ -terpinene (6.4%), 1,8-Cineol (5.3%), and carvacrol (3.1%). Adding *Zataria multiflora Boiss* essential oil to the diet had no significant effect on body weight, feed conversion ratio, livability, and production index ($P>0.05$); while, feed intake to 42 days of age and body weight to 28 days of age in antibiotic treatment was higher than the other groups ($P<0.05$). The relative weight of the carcass and different parts of carcass and abdominal fat were not affected by experimental treatments ($P>0.05$). Amount of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in thigh meat stored for 90 days after slaughtering was lower in thyme-fed groups compared to those fed antibiotic ($P<0.05$), but the effect was not significant compared to the control. According to the results, although use of *Zataria multiflora* essential oil in term of functional was not effective as antibiotic, but its active compounds with antioxidant property had favorable effect on the oxidative stability of meat in a long time so it would be considered for storing meat in fridges.

Key Words: Broilers, Carcass characteristics, Oxidative stability of meat, Performance, *Zataria multiflora Boiss* essential oil

*Corresponding author: hosseini1355@gmail.com